

4). Elitre distintamente zigrinate dalla 3.a interstria impoi e gialle all' apice; strie sottili: **substriatus** Waterh. — Elitre totalmente metalliche, con o senza zigrinatura (5).

5). Le pieghe frontali interne leggermente convergenti verso l'ocipite. Protorace fortemente dilatato anteriormente, elitre liscie, non zigrinate; tibie normalmente gialle: **palustris** Duft. — Le pieghe frontali perfettamente parallele (6).

6). Tibie perfettamente nere. Elitre più piatte, specialmente il declivio apicale meno convesso, senza zigrinatura: **pusillus** Waterh. — Tibie parzialmente bruno-giallognole, elitre più convesse, specialmente sul declivio apicale, di solito con finissima zigrinatura sulle interstrie esteriori (7).

7). Elitre più fortemente striate, ma meno distintamente zigrinate, la zigrinatura limitata alle interstrie esterne; la 2.a interstria meno larga, circa come nel *palustris*; protorace maggiormente dilatato anteriormente: **hypocrita** Putz. — Elitre con strie fine ed evanescenti e zigrinatura più accentuata, di solito già sulla 3.a o 4.a interstria; la 2.a interstria un poco più ampia, il protorace meno dilatato anteriormente. Specie orientale, constatata in Dalmazia (*laticollis* Chaud.).

8). Elitre con strie più sottili ed interstrie più o meno zigrinate, la 5.a interstria più stretta della 4.a. Striatura frontale fine e densa, poco regolare; i primi 4 articoli delle antenne di solito parzialmente anneriti: **Danieli** Reitt. — Elitre con strie più forti ed interstrie luccanti, non distintamente zigrinate, di larghezza circa eguale. — La fronte con poche ma forti strie, perfettamente regolari, i primi 4 articoli delle antenne totalmente rossicci: **rufipes** Curtis.

9). La 4.a interstria più larga della 3.a e normalmente con 2 fossette; elitre gialle verso l'apice. Specie del Mediterraneo e dell'Europa occidentale (**quadripunctatus** Dej.). — La 4.a interstria non più larga della 3.a, normalmente con una sola fossetta; elitre quasi sempre gialle verso l'apice: **biguttatus** Fabr.

53. **N. pusillus** Waterh. (Spaeth 512 e 514, Reitt. 94 e 95; *bigeminus* Thoms., Gglb. 118; *aestuans* Motsch., Reitt. 1897, 362. Eur. centr., Svezia, Inghilterra; Italia fino al Lazio; montagne della Penisola balcanica). — Istria montana: sulla vetta del Taiano piccolo, sotto sassi, 5.23 (M 2); M. Sabnik (Ch 1).

54. **N. aquaticus** L. (Gglb. 117 e Reitt. 94; Reitt. 1897, 360; Spaeth 515. Eur. bor. e centr., Siberia). — Alpi Giulie: 1 es. senza altra località, 1 es. da Kneza e 1 es. da Cerna pec, 5.98 (Schr.). — Retroterra montano di Trieste: Auremiano (teste Spr 1). — L'indicazione del PADEWIETH per Fiume (1907, 113) va riveduta.

55. **N. palustris** Duftschm. (Gglb. 118 e Reitt. 94; Reitt. 1897, 362; Spaeth 513 e 516. Nella zona boreale e media della regione palearctica). — Retroterra montano di Trieste: Roditti, 20.4.24, 2 es., uno colle