

Siberia. — Retroterra di Trieste: S. Pietro del Carso, 9.910 (Spr) e 4.911 (May, plur.). Un'unica volta anche a Trieste, in città, sul muro di una casa, 2.3.20 (M 1). — Fiume (*Pad.* 114).

Gen. *Colymbetes* Clairv.

553. *C. fuscus* L. (Schaum - Kiesw. 83, Bed. 250, Seidlitz Tab. 103, Ganglb. 503, Reitt. 229. — Eur. Mediterr.). Goriziano e Friuli: Lago di Doberdo 7.19 (R 4); Pietrarossa pr. Monfalcone, in una pozza, 11.02 (M 1); Is. Morosini 5.08 (Kr 4) e 9.08 (May 1). — Trieste e Istria sett.: Trieste, sulle alghe marine alla riva del Canal Grande, 25.3.23 (Sch 1); S. Pietro del Carso 4.911 (May 1); Noghera pr. Muggia 4.911 (Spr). — Fiume (Dep 1).

Dytiscinae.

Gen. *Eretes* Cast.

554. *E. sticticus* L. (Seidl. Tab. 104, *Eunectes*; Ganglb. 506 e Bed. N. Afr. 390, *Eretes*. — Mediterr. e quasi tutte le regioni calde, tropicali, del mondo). — La f. typ. di Linneo, alla quale corrisponde anche l'*helvolus* Klug., trovasi in Algeria, Tunisia e in Egitto. Essa ha la macchia nera frontale incisa ad angolo o biloba, il pronoto senza macchie (ab. *succinctus* Klug.) oppure con un'unica macchia mediana, più o meno marcata (cf. Bedel, Col. N. Afr. 390). — Da noi la seguente razza:

a) *sticticus griseus* Fabr. (Ent. Syst. I, 191, *tipo*: India; Bed. N. Afr. 390. — Forma ampiamente diffusa nell'Eur. merid., nell'Africa, Asia, Malesia, California, Messico ecc.). — La macchia frontale troncata trasversalmente al margine ant., il pronoto ornato di una fascia trasversale scura, divisa nel mezzo. — Trovasi nelle acque stagnanti carsiche, a fondo melmoso, che servono da abbeveratoi pel bestiame e che sono quindi spesso fortemente inquinate. — Carso di Trieste: Ternovizza pr. Aurisina (limite settentr.), un es. del tutto immaturo, 20.9.08 (Moser); Opcina 11.910 (Pr 4). — Carso istriano: Canfanaro e Dignano, 2.11.08 (M 2).

Gen. *Hydaticus* Leach.

555. *H. seminiger* De Geer (Seidl. Tab. 105, Ganglb. 507, Reitt. 230. — Eur. sett. e media). — Finora soltanto in Friuli, raro: Monfalcone, nei fossati, 9.09 (Spr 3); Is. Morosini 9.09 (May 1). — La colorazione è quella della f. typ., cioè senza macchietta gialla sulle elitre presso lo scutello.

556. *H. transversalis* Pontopp. (Schaum - Kiesw. 125, Seidlitz Tab. 105, Ganglb. 507, Reitt. 230. — Eur. sett. e media, Siberia). — Finora soltanto in Friuli: Monfalcone 9.09 (Spr 1); Is. Morosini 9.08 (May 2). La colorazione corrisponde alla f. typica.

557. *H. grammicus* Germ. (Seidl. Tab. 106, Ganglb. 508, Reitt. 230. — Eur. merid. e in certi siti dell'Eur. media). — Finora soltanto in Friuli: tra Sagrado e Pieris 4.910 (Spr 1; ivi anche Gr 1); S. Giovanni di Duino, in una pozza presso il Timavo, 9.13 (Ciana 1); Ponte Delizia al Tagliamento, div. 7.26 (Sch).