

- L' estremo apice del pene semplicemente piegato all' ingiù ³⁾ ad angolo ottuso, senza ingrossamento apicale. — 13.
13. Specie più grande, spesso bicolore, col capo e pronoto rossicci e punteggiatura più grossolana; il pene assai snello, la punta molto lunga e leggermente contorta; 8 - 10 mm. 239. *brevicollis*.
- Specie in media più piccola, di solito uniformemente scura, con punteggiatura più sottile e apparentemente più rada; il pene meno snello, la punta meno lunga e perfettamente diritta (salvo l'estremo apice rivolto all' ingiù); 7 - 9 mm. 238. *seladon*.
14. Pronoto cordiforme, convesso, fortemente dilatato nella parte anteriore, gli angoli posteriori grandi e perfettamente retti; le *strie delle elitre distintamente punteggiate*, gli omeri quasi arrotondati. L' apice del pene brevemente incurvato, senza disco apicale. Colorito bruno-piceo, le elitre di solito con stretto orlo rossastro, oppure più chiare, ferruginee; alle volte (ab. *perlaetus* Reitt.) la parte sup. con riflessi azzurri o verdastri; 8 - 10 mm. 234. *cordatus*.
- Gli angoli post. del pronoto arrotondati, ottusi od anche retti (nel *puncticollis* e specie affini), però in tal caso le strie delle elitre lisce, senza punti distinti. — 15.
15. I femori nerastri, le tibie ed i tarsi per lo più bruni o ferrugini ⁵⁾. La parte sup. del corpo nera, con leggera tinta azzurra o verdastra; gli angoli post. del pronoto ottusi, le elitre subopache, con puntini molto densi nelle interstrie, le ali completamente sviluppate; l' apice del pene semplicemente ripiegato, senza ingrossamento a forma di disco; 7.5 - 9 mm. 241. *cribricollis*.
- Le zampe totalmente ferruginee o rossiccie. — 16.
16. Almeno le elitre distintamente azzurre o verdi ⁶⁾. Il pene termina con un piccolo dischetto apicale. — 17.
- La parte sup. del corpo bruna o picea. — 18.
17. Elitre più allungate, con dentino omerale. Gli angoli post. del pronoto quasi retti, i lati spesso leggermente sinuati dinanzi alla base. La punteggiatura delle elitre un poco più forte che nell' *azureus similis*; le ali perfettamente sviluppate; il pene con dischetto apicale trasversale; 7.5 - 9 mm. — Dalmazia, Italia e varie parti della reg. mediterranea. (Sin. *violaceus* Reiche, nec Perty).
[*episcopalis* Reiche.]

⁵⁾ Zampe nerastre ha anche l' H. CONVEXICOLLIS Mén. Distinguesi dal *cribricollis* per la base delle mandibole sporgente ad angolo. La parte sup. del corpo con leggerissima tinta azzurognola o quasi perfettamente nera. — Trovati nel Caucaso, nella Transcaopia, Asia minore e Siria; però anche nella Penisola balcanica.

⁶⁾ Assai di rado avviene di trovare es. molto vecchi, i quali, visti di sopra, appaiono bruni o picci; però osservando lateralmente i margini delle elitre, si scorge quasi sempre un residuo del colorito metallico.