

3. La parte anteriore del corpo più lucente, tutt' al più il disco del pronoto debolmente zigrinato; la base del protorace più larga: **spini-barbis** Fabr. — Tutto il capo ed il pronoto distintamente zigrinati e di conseguenza più opachi; protorace più ristretto verso la base (4).

4. Protorace molto grande ed ampio, quasi della larghezza delle elitre, gli angoli post. piccolissimi, però nettamente staccati dalla rotondità dei lati, rettangolari; zampe nerastre: **megaloderus** Chaud. — Protorace più piccolo, alquanto più stretto delle elitre, lievemente sinuato fino all'apice degli angoli posteriori (5).

5. Statura meno allungata, le elitre hanno circa la forma dello *spinibarbis*, però più fortemente punteggiate e più convesse; la parte sup. azzurra, i femori di solito più o meno anneriti: **parvicollis** Chaud. — Statura più slanciata, le elitre più allungate e leggermente ristrette all'innanzi; la parte sup. di solito verdastra, le antenne e le zampe gialle, anche le epipleure e l'apice dell'addome ferrugineo. Alpi della Svizzera e dell'Austria, Sudeti e Carpazi [**rhaeticus** Heer, probabilmente = **montanus** Steph. subsp.].

6. Il 3° art. delle antenne raggiunge quasi la lunghezza del 5°; la gola con una semplice fila di setole, non inserite su una carena trasversale; omeri arrotondati, ali rudimentali: subgen. *Oreobius* Dan., con una sola specie nostrana, **imitator** Breit. — Il terzo art. alquanto più breve del 5°; la gola con una fila di setole inserite su una carena trasversale rialzata (7).

7. Elitre con sporgenza omerale distinta e di solito le ali sviluppate (eccetto che nella ♀ del *nitidus*) (8). — Elitre allungate, ovali, cogli omeri perfettamente arrotondati, senza dentino omerale, senza ali; pronoto con margine laterale stretto: subgen *Leistidius* Dan., con una unica specie nostrana, picea, colle zampe e le antenne gialle: **piceus** Fröl.

8. Il pronoto ai lati con una lista marginale abbastanza larga e distintamente ripiegata all' insù. Parte sup. del corpo verde o picea con riflessi metallici: subgen. *Leistophorus* (Reitt.) Bänn. (9). — Il pronoto ai lati con margine strettissimo. Il corpo del tutto o in gran parte ferrugineo, senza riflessi metallici: subgen. *Leistus* s. str. (10).

9. Statura meno slanciata, il protorace fortemente trasversale, ben due volte più largo che lungo, la parte sup. del corpo con debole riflesso azzurognolo o verdastro: **fulvibarbis** Dej. — Statura slanciata, quasi parallela, il protorace meno trasversale, colla rotondità laterale molto più ampia, la parte sup. del corpo distintamente verde o bronzata, il marg. del pronoto ferrugineo, le zampe e antenne gialle: **nitidus** Duft.

10. La parte sup. del corpo ferruginea, però il capo nerastro, eccetto le parti boccali; talvolta anche l'apice delle elitre nerastro; gli angoli post. del pronoto leggermente ottusi. Eur. sett. e media. Siberia occid. [**rufescens** F.]. — Totalmente ferrugineo; gli angoli post. del pronoto piccoli, ma nettamente rettangolari: **ferrugineus** L.