

482. **Br. sclopeta** Fabr. (Syst. Eleuth. I, 220, *tipo*: Parigi; Dej. I, 322, Schaum 242, Ganglb. 421, Bed. 126 e N. Afr. 312, Apfb. 354, Reitt. 200; Porta 1909, 110, Müll. 1911, 68 e Reitt. 1919, 139. — Reg. Mediterranea, Francia, Belgio; sec. Reitter anche in Moravia). — Da noi finora soltanto in Istria, nella zona prettamente mediterranea: Parenzo 6.20 (Ch 1); Rovigno al Lago di Ran, 4.26 (Stolfa); Pola, com. (Web); Brioni 4.05 (Pa 6). — L'indicazione «Trieste» del DUFTSCHMID (Fn. Austr. II, 235) non sembra esatta. Posso asserire che almeno adesso manca assolutamente il *Br. sclopeta* nei dint. di Trieste.

Gen. *Aptinus* Bonelli.

483. **A. bombard**a Illig. (Ganglb. 422, Reitt. Fn. Germ. 200 e Reitt. Ent. Blätt. 1919, 132; *mutilatus* Fabr. Syst. Eleuth. I, 218, Schaum 237; *mutilatus* + *atratus* Dej. I, 293 e 294. — Alpi orient., Carpazi, Balcania sett.). — Nella reg. carsica e montana, in siti boschivi, umidi, ombrosi, sotto i sassi, IV - VIII; es. immaturi in V (Lipizza). — Goriziano: Mat-taur (pr. Montemaggiore), Dol pr. Volzano, S. Lucia, Selva Tarnova (Ciaun). — Altipiano carsico e retroterra mont. di Trieste: nelle doline del Carso dietro Opicina, Vedetta Alice e M. Spaccato, nella Conca di Orleg, nel bosco di Lipizza, M. Castellaro, M. Ciucco pr. Roditti, S. Canziano, Nigrignano, Monte Re. — Istria montana: Taiano, Mune, M. Maggiore. — Retroterra di Fiume: M. Nevoso e Bitoraj.

(L'indicazione del DEPOLI, 1913, 53, relativa all'Isola di Veglia, desunta dal lavoro dello STUSSINER, pag. 92, non si riferisce a questo genere, ma bensì al *Brachynus bombard*a Dej. = *plagiatus* Reiche).

Hygrobiidae.

Gen. *Hygrobia* Latr.

484. **H. tarda** Herbst (Ganglb. 438, Reitter 205, Bedel N. Afr. 331; *Pelobius Hermann*i Schaum u. Kiesw. Ins. Deutschl. I, 2. Hälfte, 24. — Mediterr., Eur. occid. e in certi siti dell'Eur. media). — Nella V. G. da Udine e Trieste al sud, nelle pozze a fondo melmoso. — Friuli: Castions di Strada, raro (*Gortani* 62). — Trieste: nel grande abbeveratoio presso Contovello 07 (Sch, plur); in uno stagno pr. Conconello 4.08 (Ku); a suo tempo anche nel laghetto (ora prosciugato) sul colle di Terstenicco 1.99 (Cz 1). — Istria: Canfanaro e Dignano, negli abbeveratoi del bestiame, 11.08 (M 3); nella reg. del M. Taiano presso Tublje 4.08 (Kr 1) ed anche nella piccola pozza sotto la vetta del Taiano, a circa 1000 m, 5.19 (R 1). — Isole: Veglia (Net); Arbe, Campora, 7.06 (M); Unie 8.14 (Neuhaus).

Halipilidae.

Abbrev. — Schaum - Kiesw. = SCHAUM e KIESENWETTER, Dytiscidae, in ERICHSON, Natg. Ins. Deutschl. I. Baud. II. Hälfte, 1868. — Seidl. Tab. = SEIDLITZ, Bestimmungstabelle der Dytiscidae und Gyrinidae. (Verh. nat. Ver. Brünn, 1887). — Zimm. Arch. Natg. 1919 = ZIMMERMANN, Die Schwimmkäfer des Deutschen Ent. Museums zu Berlin-Dahlem. (Archiv für Naturgeschichte, 83. Jahrg., Abt. A; 1919). — Zimm. Tab. 1924 = ZIMMERMANN, Die Halipiden der Welt. (Ent. Blätt. 1924).