

17). Specie più grande, più piatta, con strie elitrati più sottili; corpo bronzeo-verdastro, elitre con numerose macchiette allungate, gialle, nella metà basale ed alcune macchie maggiori nella metà apicale; 3.5 - 3.8 mm.

131. *fumigatum*.

— Specie più piccola, più convessa, con strie elitrati più forti, le interne quasi sulciformi; corpo verdastro, di solito l'apice delle elitre ed una macchia preapicale giallastra; 2.8 - 3 mm.

132. *assimile*.

18). L'ottava stria delle elitre anteriormente accorciata o tutt' al più unita da una sottilissima fila di punti colla stria marginale: *Synechostictus* Motsch. pars (19). — L'ottava stria nettamente incisa fino alla fusione completa colla stria marginale nel tratto anteriore delle elitre (20).

19). Specie più grande, lunga 5.6 - 7 mm, con elitre poco convesse, omeri sporgenti e strie elitrati evanescenti all'apice; corpo verde o azzurro metallico, zampe gialle, antenne almeno parzialmente rosastre.¹¹⁾

126. *ruficorne*.

— Specie più piccola, al massimo 4.5 mm, colle elitre più convesse, strie dorsali grossolane, evanescenti già nella terza parte apicale; corpo nero-verdastro, di solito con macchia preapicale giallognola, la base delle antenne ed i piedi gialli; omeri sporgenti.¹²⁾

127. *elongatum*.

20). Le parti laterali del prosterno con punteggiatura grossolana: *Synechostictus* pars¹³⁾. — Senza punti grossolani (21).

21). La linea mediana del pronoto dilatata a forma di solco nella terza parte basale. Specie brune o picee, senza o con debole riflesso metallico; 5.5 - 6.5 mm; *Pseudolimnaeum* Kraatz (22). — La linea med. del pronoto sottile o evanescente dinnanzi alla base (23).

22). Elitre ovali e leggermente convesse; corpo bruno, talvolta con leggeri riflessi metallici verdi-bluastri; zampe giallo-rossiccie, le antenne talvolta offuscate dal 3. art. impoi.

128. *Doderoi*.

— Elitre allungate e depresse, fortemente striate; corpo bruno o piceo, il margine suturale e laterale delle elitre spesso rossastro; zampe e antenne giallo-rossiccie.

129. *inustum*.

23). Specie alofila, attera, delle spiagge marine, colle elitre allungate, piatte, fortemente striate; la terza e la quarta stria si congiungono nella fossetta dorsale anteriore. Corpo rosso-bruno, elitre brune o picee; il capo ingrossato, poco più stretto del protorace, le tempie, viste di sopra, poco più brevi degli occhi, la setola sopraorbitale post. situata dietro il livello degli occhi; 3 - 4 mm. (*Limnaeum* Steph.)

130. *nigropiceum*.

11) Specie affini: *B. Millerianum* Heyd., antenne meno slanciate e strie elitr. più evidenti all'apice; 5.5 - 6 mm., Alpi, Carpazi, Germania mont. — *B. stomoides* Dej., colle spalle evidentemente arrotondate; 5 - 6 mm. Eur. media.

12) Specie affine: *B. decoratum* Duft., elitre ovali, cogli omeri più o meno arrotondati, senza macchia preapicale; 3.5 - 4.5 mm. Eur. centr.

13) Due specie del Mediterr. occid.: *B. cribrum* Duv., corpo scuro, verdastro, omeri sporgenti, e *B. Dahli* Dej., corpo ferrugineo, omeri meno sporgenti.