

— Specie gialla, soltanto il capo spesso più scuro, i palpi sempre gialli, pallidi. Gli angoli post. del pronoto perfettamente retti. Vive esclus. presso le acque correnti. 153. *micros*.

7). Il mento con due fovee nettamente incise, rotonde. Specie più grande e più robusta, totalmente ferruginea, elitre convesse, le strie interne fortemente punteggiate; la stria apicale meno distante dalla stria submarginale; 3 mm (*Porotachys* Net.) 161. *bisulcatus*.

— Il mento senza fovee nettamente incise; colorito diverso; la stria apicale molto più distante dalla stria submarginale (8).

8). Elitre convesse, con due strie interne, lisce; la stria submarginale integra, nettamente incisa e, nel tratto anteriore, alquanto distante dalla doccia laterale delle elitre. I solchi frontali convergenti e prolungati fino al margine ant. del clipeo. Mesosterno con solco mediano. (*Sphaerotachys* m.). Colorito normale: nero, lucente, con macchia preapicale rossa; 2 mm. 160. *haemorrhoidalis*.

— Elitre più o meno appiattite, con almeno tre strie interne, punteggiate; la stria submarginale obliterata nel mezzo, oppure integra, in tal caso più vicina al margine: *Tachyura* Motsch. (9).

9). La stria submarginale obliterata nel mezzo (10). — La stria submarginale integra. Elitre più strette e allungate, con 4 o 5 strie dorsali interne, totalmente nere, oppure con macchia rossa preapicale poco distinta; la v. *curvimanus* possiede 4 macchie giallo-rossiccie ben marcate; 2 - 2.2 mm. 157. *parvulus*.

10). Elitre con 4 - 5 strie fortemente punteggiate; la stria submarginale molto assottigliata, però non del tutto interrotta dinanzi alla metà. Colorito nero, lucente, elitre con quattro macchie giallo-bruno o rossiccie; 2.5 - 2.8 mm. 158. *quadrisignatus*.

— Elitre soltanto con 3 strie interne, debolmente punteggiate; la stria submarginale ampiamente interrotta nel mezzo. La f. *typ.* è totalmente nera; la ab. *bisbimaculatus* con 4 macchie gialle; 2.3 - 2.6 mm. 159. *sextriatus*.

151. **T. (*Tachyta*) nanus** Gyll. (Schaum 747, Bed. 37, Reitt. 1884, 120, Bed. N. Afr. 72; *Tachyta nana* Ganglb. 181 e Reitt. 125. — Reg. paleart. e nearct.; in Balcania esclus. nella zona montana. Vive sotto le cortecce degli alberi). — Nella parte sett. della V. G., raro. — Friuli e Gorizia: Palmanova 3.25 (Vallon); Gorizia 8.910 (May 1) e Panoviz 6.911 (Gr 2); Selva Tarnova 5.90 (Schr 1). — Nevoso, Hermsburg (Sim).

152. **T. (*Tachys* s. str.) bistratus** Duft. (Ganglb. 178, Bed. N. Afr. 73, Reitt. 124; *bistratus* pars, Schaum 745, Reitt. 1884, 121. — Europa, Reg. Mediterr.). — Trovati nelle vallate, però anche in altri siti umidi del retroterra fino a circa 600 m. Sta sotto i sassi e nei detriti lungo i fossati, le pozze e i laghi; talvolta anche in riva al mare sotto i mucchi di *Zostera*. Comune in II - XI. — Friuli: Palmanova, Monfal-