

Dell'ab. *hirticornis* Krynn. mi constano molti esemplari di S. Giovanni presso Trieste ed alcuni di Monfalcone.

St. abdominalis Gené (Schauberger in Cat. Winkler, spec. propr.; Schaum 614; *teutonus* var. Bed., Ganglb. et Reitt. — Reg. Mediterr.). — Frequente in certi siti paludosi in Dalmazia (spec. al Lago di Boccagnazzo pr. Zara). Secondo PADEWIETH (1907, 114) anche nei dint. Fiume.

283. St. *Skrimshiranus* Steph. (Schaum 615, Bed 82, Gglb. 371, Reitt. 179 e Tab. 130; *vaporariorum* var. *melanocephalus* Dej. IV, 409. — Europa media, Reg. Mediterr., Caucasia). — Rarissimo in Friuli: Is. Morosini 4.09 (Kr 1); Monfalcone 6.19 (Ch 1). — Nella coll. Steinbühler un es. di Pola (località non sicura). — Più frequente in Dalmazia.

St. discophorus Fisch. (Dej. IV, 409, Schaum 615, Ganglb. 371, Reitt. 179 e Tab. 130. — Specie pontica: Transcaspia, Asia min., Balcania, Italia, Francia mer.; anche al Lago di Neusiedel pr. Vienna). — E' stato indicato pei dint. di Fiume (Pad. 114); io non conosco che es. dalmati.

284. St. *mixtus* Herbst (Bed. 82, Ganglb. 371, Reitt. 179 e Tab. 131, Bed. N. Afr. 154; Fiori, Riv. Col. Ital. 1914, 177; Müller Ent. Blätt. 1916, 83; *vespertinus* Panzer, Dej. IV. 421 e Schaum 616. — Europa, Reg. Mediterr., Siberia). — Gorizia e Friuli: Podgora, frequente nei fossati (Schr); Lucinico 4.93 (Schr 1); Ajello 7.20 (Siega 1); S. Giovanni di Duino 5.22 (Ch 1). — Istria: Val Quieto inf. 5.23 (R e Sch 5). — L'ab. *Ziegleri* in Val Quieto assieme al tipo (R e Sch 6).

St. proximus Dej. (Spec. IV, 421, *tipi*: Russia mer. e Corfù; Müll. Wien. ent. Zeitg. 1921, 138; ab. *narentinus* Apfb. 203, *tipo*: Metkovich in Dalmazia; *narentinus* Müll., Ent. Blätt. 1916, 82. — Balcania; probab. più diffuso nella Reg. Mediterr.). — Frequente nei paludi della Dalmazia; secondo STUSSINER (1881, 92) anche nell'Isola di Veglia, alle sponde del Lago Grande, 5.79.

Gen. *Egadroma* Motsch., Tschitsch.

E. MARGINATUM Dej. (Spec. IV, 427, Ganglb. 372, Reitt. Tab. 130, Bed. N. Afr. 155. — Reg. Mediterr.). — E' stato segnalato dai dint. di Fiume (Pad. 114). Io però non ho veduto che es. dalmati (Metkovic, Budua) e vorrei che la presenza a Fiume venisse nuovamente accertata, prima di poter annoverare con certezza l'*E. marginatum* tra le specie della V. G.

Gen. *Acupalpus* Dej.

Abbrev. — Reitt. 1884 = REITTER, Bestimmungstabelle der europäischen *Acupalpus*-Arten. (Wien. ent. Zeitg. 1884, 74-79).

Nota. — Ho dovuto rifare completamente lo studio degli *Acupalpus* e sono riuscito a trovare parecchi caratteri nuovi, atti a facilitare la distinzione delle specie. Anzitutto la *microscultura*, la quale non era stata finora studiata nel genere *Acupalpus*. Ho trovato poi che i peli eretti sul prosterno non esistono soltanto negli *Anthracus*, come si ammetteva finora, ma benanco in parecchie specie di *Acupalpus* s. str., mentre mancano in altre specie affini. Nel complesso caotico dell'*A. dorsalis*, colle sue numerose varietà ed aberrazioni, ho dovuto intraprendere lo studio microscopico del pene, per stabilire le unità sistematiche; e sono giunto alla conclusione di dover scindere il complesso del *dorsalis* in diverse specie nettamente distinte, laddove si ammetteva finora una sola specie di una variabilità inverosimile.