

— Specie più piccola e di colorito più chiaro, elitre meno allungate, più arrotondate ai lati, gialle, con alcune macchiette e fascie ondulate verdastre, la regione omerale totalmente gialla fino al margine; 3 - 4 mm.

98. *semipunctatum*.

53). Strie elitr. abbreviate o evanescenti all'apice (54). — Striatura completa. Capo e pronoto verde-bronzati, elitre gialle, pallide, di solito con una macchia trasversale comune, più scura, dietro la metà; senza microscultura; 2.5 - 3 mm. (*Notaphemphanes* Net.).

99. *ephippium*.

54). I solchi frontali paralleli, essi si prolungano bensì talvolta sul clipeo, però vanno a terminare nella fossetta setigera ai lati del medesimo (55). — I solchi frontali convergono direttamente fino al margine ant. del clipeo, oppure essi hanno almeno un prolungamento obliquo sul clipeo, che va verso la parte centrale del margine anteriore; la fossetta setigera resta all'esterno di tale prolungamento (57).

55). Elitre zigrinate, opache: *Talanes* Motsch. Corpo nero; leggermente azzurro le elitre rosse nella metà apicale, senza piega clavicolare alla base ³⁰); capo e pronoto punteggiati; 2 - 2.5 mm.

133. *aspericolle*.

— Elitre lucide, senza microscultura ³¹), con finissima piega clavicolare alla base, nascosta dietro gli angoli posteriori del pronoto: *Emphanes* Motsch. (56).

56). Elitre nero-verdastre, con macchia omerale rossastra ed una più piccola preapicale gialla; 2.5 - 3 mm.

134. *latiplaga*.

— Elitre unicolori, nere o leggermente metalliche, come il resto del corpo (*f. typ.*); oppure brune (*sbsp. rivulare*); 2.5 - 3 mm.

135. *minimum*.

57). I solchi frontali tra gli occhi paralleli o poco convergenti, con prolungamento obliquo, meno profondo, sul clipeo (58). — I solchi frontali obliqui e profondamente incisi fino al margine anteriore del clipeo (62).

58). Pronoto meno convesso, la base alquanto più larga della strozzatura mesosternale, le fosse basali più ampie e delimitate all'esterno da una piega postangolare distinta: *Semicampa* Net. ³²).

— Pronoto convesso e molto ristretto alla base, gli angoli post. quasi aderenti alla strozzatura mesosternale; le fossette basali profonde, però molto strette e allungate, ricurve all'infuori (59).

³⁰) Vedi anche *B. subfasciatum* Chaud. della Dalmazia e Balcania. Capo e pronoto non punteggiati.

³¹) Vedi anche *B. normannum* Dej: dell'Eur. occid., con piega clavicolare rudimentale; elitre nere o brune, leggermente metalliche, con o senza macchia preapicale più chiara.

³²) Due specie dell'Eur. sett. e media. — *B. Schuppeli* Dej., corpo nero-verdastro, elitre con microscultura reticolare trasversale. — *B. gilvipes* Sturm, corpo nero o bruno, lucente, elitre senza microscultura, salvo all'estremo apice.