

4. Pronoto quasi liscio alla base; elitre picee o leggermente azzurre, con strie sottili ed interstrie quasi piane; l'angolo omerale molto ottuso; i femori ant. assai debolmente crenulati allo spigolo post. ventrale, talvolta quasi lisci; — mm. — Eur. media. [terricola Herbst.]
 — Pronoto punteggiato alla base e lungo il margine laterale; elitre più intensamente azzurre o violacee, con strie più forti ed interstrie più convesse; gli omeri più angolosi; 16 - 19 mm. — Bosnia, Serbia, Bulgaria, Transilvania. [punctatus Dej.]
5. Le unghie più o meno dentellate al margine interno verso la base; il pronoto con orlo basale più o meno distinto; colorito nero o azzurro, di rado bruno (*L. elegans*). — 6.
 — Le unghie affatto lisce e di solito anche più esili e lunghe; la base del pronoto non orlata, nemmeno verso gli angoli post.; colorito bruno o rossiccio. (Specie attere, quasi esclus. cavernicole). — 9.
6. Mesosterno con sporgenza angolosa o dentiforme dinanzi alle anche intermedie. (Specie attere o subattere). — 7.
 — Mesosterno senza sporgenza angolosa o dentiforme. (Pronoto con orlo basale intero, elitre poco convesse verso l'apice). — 10.
7. Subg. *Odontosphodrus* Jeann. — Addome con numerosi puntini piligeri; sul capo, dietro gli occhi, un gruppo di grossi punti setigeri più o meno numerosi. Pronoto interamente orlato alla base, con due o più setole laterali nella metà anteriore; elitre fortemente convesse verso l'apice; il primo art. dei tarsi post. pubescente anche di sotto; colorito del corpo nero, le elitre leggermente azzurrognole; 15 - 19 mm. 406. *elongatus* Dej.
 — Addome soltanto coi due soliti punti setigeri al margine post. dei singoli sterniti; un solo punto setigero postorbitale e una sola setola laterale ant. sul pronoto. — 8.
8. Specie grande, azzurra, col pronoto interamente orlato alla base e i tarsi post. quasi glabri di sotto; le elitre appiattite sul dorso; poco convesse verso l'apice; gli occhi più grandi e sporgenti, le zampe e le antenne più robuste; 17 - 24 mm. 405. *dalmatinus* Dej.
 — Specie piccola, rosso-bruna o bruno-picea, coll'orlo basale del pronoto molto ridotto, visibile soltanto d'ambo i lati verso gli angoli post.; il primo art. dei tarsi post. pubescente anche di sotto; le elitre più convesse all'apice, gli occhi più piccoli, le zampe e le antenne più esili e più allungate; la dentellatura delle unghie debole, poco distinta; 11 - 12 mm. 407. *elegans* Dej.
9. Subg. *Antisphodrus* Schauf. — L'addome normalmente con due soli punti setigeri dinanzi al margine post. dei singoli sterniti e di solito anche un solo punto setigero postorbitale; le quattro tibie post. con carena dorsale meno elevata; 12,5 - 15 mm. 408. *Schreibersi* Küst.
 — L'addome con quattro o più punti setigeri dinanzi al margine post. dei singoli sterniti e due o tre punti postorbitali; le quattro tibie post. con carena dorsale elevata, tagliente; 12 - 20 mm. 409. *cavicola* Schaum.