

82. **D. globosus** Herbst (Gglb. 138, Reitt. 102 e Müll. 110. Reg. palearct. Frequent nell'Europa centr., tanto in pianura, quanto in montagna). — Specie igrofila, degli acquitrini e dei prati umidi, abbastanza diffusa nel Goriziano: Mataiur, vetta, sotto pietre 7.24 (M 1); Plezzo, Podgora e Staragora (Schr), Panoviz 6.911, plur. (Gr), Doberdo 4.911 (Gr), Mossa 5.21, plur. (Sch), Monfalcone (Gglb e Gr), Blanchis 5.21 (R). — In Istria finora soltanto a Mune 4.21 (Mey) e nella Valle dell'Arsa (Net 1).

Gli esemplari osservati finora corrispondono pel colorito e per la forma al *D. globosus* f. typ. dell'Europa centrale.

83. **D. (Reichelodes) rotundipennis** Chaud. (Gglb. 139 e Müll. 113. Specie montana delle Alpi orient. e del Carso). — Nella reg. montana ed alpina della V. G., nei boschi di faggio sotto sassi e nel terriccio. — Alpi Giulie: Lago di Bochinia, Scherbina, M. Canin, M. Nero di Tolmino. — Alto Carso: Selva di Tarnova (Selovez, Ciaun, Loqua) e Selva del Piro (Monte Re). — Monti dell'Istria: Auremiano 5.910 (Spr), M. Ciucco sopra Roditti 6.910 (sec. Spr), e M. Maggiore, nei boschi di faggio sopra il rifugio, spec. nelle doline IV, V e IX, abbastanza frequente. — Carso liburnico: Risnjak (Apfb. 74), Fuzine e Lokve (Meyer 1912, 82); M. Nevoso (Sim).

Omophroninae.

Gen. **Omophron** Latr.

84. **O. limbatum** F. (Gglb. 120 e Reitt. 76; *Epactius limbatus* Bed. N. Afr. 37. — Eur. med. e mer., Algeria, Siberia). — Sulle sabbie lungo l'Isonzo: Podgora 10.90 (Schr 1); Pieris 25.4.09 (Sp 6); I. Morosini 10.4.09 (M 3).

Broscinae.

Gen. **Broscus** Panz.

85. **B. cephalotes** L. (Gglb. 144 e Reitt. 104. — Eur. sett. e media). — Lungo l'Isonzo e il Vipacco. Specie notturna che scava delle gallerie nel terreno sabbioso; VI - VIII; raro. — Volzano (Ga e Ku 6); Podgora (Schr e Spr 2); Aidussina (teste Bianchi). — Anche a Tolmezzo in Carnia (Sch).

Bembidiinae.

Gen. **Asaphidion** Gozis¹⁾.

86. **A. caraboides** Schrank s. l. (Netolitzky, Ent. Blätt. 1918, Verbreitungskarte. — Nella parte mont. dell'Eur. med. e mer.; Caucasia (sbsp. *varipes* Motsch.); manca nella Germ. sett., in Boemia e nella pianura ungherese.). — Nella V. G. due razze distinte:

1) Indicazioni dubbiose:

A. ROSSI Schr., dintorni di Fiume (*Pad.* 113). E' noto finora dalla reg. mediterr. occ., dalla Grecia e da Creta.

A. CARABOIDES Schr., dint. di Fiume (*Pad.* 113). Resta a stabilirsi se si tratta della f. typ o di una delle due razze meridionali (*nebulosum* e *balcanicum*).