

(Salonichi-Schatzmayr). — Non è vero che i nostri es. di Trieste corrispondano al *lacustris*, come è stato indicato dal JOSEPH (Ber. ent. Sect., Breslau, 1871, 15).

Gen. *Diachromus* Er.

306. **D. germanus** L. (Schaum 560, Bed. 67, Ganglb. 365, Reitt. 170 e Tab. 70, Bed. N. Afr. 149; Schauberg, Col. Centr. 1926, 46. — Eur. media, Reg. Mediterr.). — Abbastanza frequente in certi siti umidi, argillosi, sotto i sassi, sulle erbe dei prati o sulle spighe dei cereali III - VIII. — Friuli e Goriziano: Palmanova, Sotto Selva; Caporetto Chiapovano, Panoviz, Gorizia, Ronchi, Monfalcone, Isola Morosini; Aidussina. — Trieste: lungo il torrente del Boschetto 4.08 (Gab 1); sull'altipiano a Grociana in un campo di grano 5.06 (M 1) e a S. Pietro, sotto sassi 6.78 (Mill. 463). — Istria: Noghera, Portorose e Val Quieto, IV e V, non raro. La località di Pola (coll. Steinb 8) non mi sembra sicura.

Gen. *Gynandromorphus* Dej.

307. **G. etruscus** Quens. (Dej. IV, 188, Bed. 68, Ganglb. 364, Reitt. Tab. 70. — Reg. mediterr. europea, dalla Spagna fino al Caucaso). — Rariss. nella parte sud-orient. dell'Istria: Lago di Cepich 5.22 (Cir 1) e Albona 4.24 (Cir 1). — Più diffuso in Dalmazia, nei prati umidi delle regione argillose.

Gen. *Anisodactylus* Dej.

308. **A. (Hexatrachus) pseudoaeneus** Dej. (Spec. IV, 137, tipo: Crimea; Schauberg. Col. Centr. 1926, 49; *poeciloides* pars + *pseudoaeneus*, Ganglb. 263, Reitt. 171 e Tab. 74. — Specie orientale). — La f. typ. della Russia merid. ha le elitre in gran parte pubescenti ed anche il capo e l'addome con pubescenza e punteggiatura più estesa. — Da noi la seguente razza:

a) ***pseudoaeneus confusus*** Ganglb., Schaub. (Col. Centr. 1926, 49; *poeciloides* v. *confusus* Ganglb., Käf. Mitteleur. 363; *poeciloides* pars, Reitt. 171 e Tab. 74; *pseudoaeneus* Schaum 568, nec Dej. — Ungheria, Balcania). — La pubescenza delle elitre limitata alle interstrie esterne ed alla parte apicale delle interne; il capo soltanto con minutissimi puntini piligeri verso gli occhi. — Specie alofila, rarissima nel Golfo di Trieste: Monfalcone 5.912 (Gr 1) e Noghera 5.911 (Spr 4). — Frequente nel paludo salmastro pr. Franona in Istria, 6.79 (Stuss. 92). — Isole: Cherso, presso Ossero, 4.14, pochi es. (Schatzm. Is. Adr. 150).

Nota. — Il dott. SCHAUBERGER, in un recentissimo studio sugli *Anisodactylus* del gruppo *Hexatrachus* (Col. Centralblatt 1926, 49), ha dimostrato che le due specie *poeciloides* e *pseudoaeneus* vanno definite in un modo ben diverso da quello ammesso finora dagli autori. Il *confusus* Ganglb., alla quale appartengono anche i nostri es. adriatici, è una varietà del *pseudoaeneus*, e non già del *poeciloides*. Esso possiede come il *pseudoaeneus* l'apice del pene arrotondato, ne differisce però per minor sviluppo della pubescenza.