

18. I tarsi post. snelli, il 1.o art. quasi tanto lungo quanto i due seguenti riuniti. Le elitre di solito con striatura trasversale microscopica. L'addome del ♂ senza fossa tomentata.

Gen. **Acupalpus** Dej.

- I tarsi post. meno snelli, il 1.o art. evidentemente meno lungo dei due seguenti riuniti. Le elitre senza microscultura. L'addome del maschio con una fossetta basale tomentata. **Bradycellus** Er.

Trib. **Ditomini**¹⁾

Gen. **Carterus** Dej.

221. **C. (Odogenius) dama** Rossi (Apfb. 170; Stichel, Zeitschr. Ins. Biol. 1923, 89; *dama* pars (exclus. *gilvipes*) Bed. N. Afr. 116 e Reitt. Tab. 51; *Ditomus dama* Dej. I, 442; Pioch., L'Abeille 1873, 57; Gglb. 339. — Mediterr.). — Da noi finora soltanto nei dint. di Pola (Steinb 3 e Web 2). — Più diffuso lungo il litorale dalmato.

222. **C. tricuspidatus** Fabr. (Bed. N. Afr. 115, Apfb. 170 e Stichel I. c. 89; *Ditomus tricuspidatus*, Pioch. I. c. 53, Ganglb. 339 e Reitt. Tab. 50; *cornutus* Dej. I, 440. — Mediterr.). — Sembra limitato all'Istria mer. e alla reg. del Carnaro: Pola, non raro (Schlett, Steinb, Web); Fiume (Steinb 4; indicato anche dal *Pad.* 114); Ossero nell'Isola di Cherso (*Dejean* I, 441); Curilla nell'Isola di Lussin, IV e VII, 3 esemp. (*Schatz.* Is. Adr. 123); Carlopago (*Kuthy* 36).

223. **C. (Sabienus) calydonius** Rossi (Bed. N. Afr. 115, Apfb. 170 e Stichel I. c. 91; *Ditomus calydonius* Dej. I, 439, Pioch. I. c. 51, Ganglb. 338 e Reitt. Tab. 50. — Mediterr.). — Egualmente soltanto nella parte mer.-orient. della V. G.: Pola (Steinb 3); Cantrida pr. Fiume (Dep. 2); Unie 7.13 (*Schatzm.*, Rivista «Fiume» 1925, 69).

Gen. **Ditomus** Bon.

224. **D. clypeatus** Rossi (Bed. N. Afr. 120, Apfb. 175 e Stichel, Zeit. Ins. Biol. 1923, 97; *Aristus clypeatus* Pioch. L'Abeille 1873, 18, Ganglb. 338 e Reitt. Tab. 45; *Ditomus sulcatus* Dej. I, 446. — Mediterr., dalla Spagna fino in Grecia). — Da noi spec. nell'Istria mer., al nord fin Salvore e Fiume. — Salvore, sulle spighe di una graminacea, 6.24 verso sera (Sch 1); Pola 6.15 (May; anche Schlett, Steinb e Web); Porto Albona 7.20 (Sch 1); Fiume (*Pad.* 114); Curilla pr. Lussin, IV e VII, 2 es. (*Schatz.* Is. Adr. 142); Unie, nei campi della zona carsica, sotto i sassi, IV - V e VIII.

Trib. **Harpalini**.

Gen. **Acinopus** Latreille.

225. **A. (Acinopus s. str.) picipes** Ol. (Ganglb. 336 e Reitt. Tab. 44; (*tenebrioides* Duft. Fn. Austr. II, 126, tipo: Trieste; *megacephalus* Dej. IV, 33. — Eur. mer. e Regione pontica, fino al Mar Caspio). — Limitato

1). Menziono colle dovute riserve il CARTEROPHONUS CORDICOLLIS Serv. (*Ophonus ditomoides* Dej.), il quale è stato segnalato da Fiume (*Pad.* 144) e dalla Dalmazia (*Ganglb.* 341). Io non conosco es. della reg. adriatica orientale.