

elitre lievemente striate e ab. *seminiger* Reitt. colle elitre nere³⁾.
Lungh. 4 - 6,5 mm. 481. **explodens.**

- Statura maggiore e più robusta, elitre distint. striate. Il pene, in visione dorsale, abbastanza bruscamente dilatato nel mezzo e poi gradatamente ristretto verso l'apice; antenne robuste, unicolori, ferruginee; 8 - 10 mm. — Balcania, Asia minore, Siria.

[*peregrinus* Apfb.]

15. Subg. *Pseudaptinus* Porta. — Elitre con interstrie nettamente costate e gli omeri meno arrotondati. Capo e pronoto ferruginei, alle volte rosso-bruni; antenne e zampe giallo-rossicce, talvolta più scure; addome nerastro; 10 - 11 mm. — Italia media e merid., Sicilia.

[*italicus* Dej.]

- Elitre con interstrie poco elevate ed omeri ampiamente arrotondati. Del resto molto simile al precedente; 8,5 - 10 mm. — Penisola iberica; l'indicazione relativa alla Sicilia non sembra accertata.

[*bellicosus* Duf.]

476. **Br. immaculicornis** Dejean (Spec. II, 466, *tipi*: Francia merid.: Schaum 241, Apfb. 351, nota, Porta 1909, 114, Müll. 1911, 69, Bed. N. Afr. 312 e Reitt. 1919, 137. — Mediterr. occid., Istria, Dalm.). — Nelle vallate dell'Istria in siti argillosi, umidi, sotto i sassi, le zolle di terra, detriti vegetali ecc., dalla fine di III fin VI, talvolta comune: Noghera in Val d'Ospo, plur.; Decani alle sponde del Risano, molti es. trascinati dalle acque, 6.911 (Gr, Spr); Val Quietò, spec. nella parte inf., in III e IV plur. (Sch), un es. anche nel tratto sup. verso San Stefano (M); Valle d'Arsa (Net).

477. **Br. crepitans** L. (Schaum 240, Gglb. 241, Apfb. 347, Reitt. 201, Porta 1909, 112, Müll. 1911, 69 e Reitt. 1919, 142. — Eur. media, Mediterr., Siberia). — Diffuso dalla costa fino a oltre 1000 m (M. Taiano, vetta), al nord fin Tolmino. Trovasi nei prati, nei campi e nei giardini, sotto le pietre, anche nel carso in siti umidi, adatti, spec. in III - V, però anche più tardi fin X; es. immaturi in IV (Salvore).

Goriziano: Tolmino, Volzano, S. Lucia, Salcano, M. Santo (vetta) e Gorizia. — Friuli: Borgnano pr. Cormons, Torreano pr. Cividale, Monfalcone, Grado, Timavo. — Trieste: S. Giovanni, Boschetto, S. Sabba; nel retroterra a Comeno, Lipizza, Cossana. — Istria: Noghera-Ospo, Decani, Salvore, Val Quietò (raro), Parenzo, Rovigno (presso il Lago di Ran e nel Palù), Pola, Laurana; nell'interno a Cosina e sul M. Taiano. — Isole: Brioni, Veglia, Lussin e Unie.

L'ab. *fallax* Apf. trovasi in varie località insieme colla f. typ., specialmente nella zona litorale. Dell'ab. *subcostatus* Müll. finora un unico es. nei paludi di Zaule (Sch).

3) Altre varietà, delle quali non conosco che la descrizione: ab. *variventris* Schauf. cogli ultimi due sterniti addom. rossi, ab. *abdominalis* Reitt. coll'addome del tutto rosso e var. *Prokeschi* Mader, insetto totalmente piccolo, soltanto le elitre verdi, striate.