

— Pronoto con base leggermente obliqua verso gli angoli post., i quali sono di conseguenza più ottusi; elitre con orlo omerale arrotondato ³⁾; due punti setigeri nel tratto apicale della 3.a stria. Specie più stretta, bruna fin picea, elitre allungate, poco convesse, con microscultura finissima; 3.5 - 4 mm. **146. quinquestriatum.**

5). Margine omerale più o meno angoloso, in modo che ne risulta un brevissimo orlo basale che s'incontra col margine laterale (6). — Margine omerale perfettamente arrotondato (10).

6). Corpo sup. metallico; elitre con microscultura reticolare oppure liscie, senza rialzo careniforme apicale (7). — Corpo bruno o nerastro; elitre con striatura trasversale microscopica e con leggera piega careniforme che accompagna il tratto apicale della 5.a stria; 3 - 3.5 mm. (*Phila* Motsch.). **144. obtusum.**

7). Il capo lateralmente, tra i solchi frontali e il marg. interno degli occhi, con una semplice «piega frontale» che racchiude il punto sopraorbitale (8). — Le pieghe frontali raddoppiate da un solco che va dal punto sopraorbitale all'indietro: *Neja* Motsch. ⁴⁾.

8). Elitre distintamente zigrinate (9). — Elitre liscie, lucenti, con strie punteggiate, accorciate all'apice; pronoto fortemente cordiforme; 2.5 - 4 mm. (*Metallina* pars.). **93. lampros.**

9). Antenne nere, pronoto fortemente convesso, cordiforme; strie elitr. accorciate; corpo sup. bronzeo, con o senza macchia preapicale gialla; 3 - 4 mm. (*Metallina* pars.). **92. pygmaeum.**

— Antenne gialle alla base, pronoto più ampio, meno convesso; le strie elitr. raggiungono più o meno l'apice ⁵⁾; corpo sup. bronzeo; 3.5 - 5 mm (*Chlorodium* Motsch.). **91. splendidum.**

10). I due solchi frontali poco distinti nella punteggiatura rugosa del capo, la quale si estende fino agli occhi (11). — Il capo liscio, di rado parzialmente punteggiato, con due solchi frontali nettamente incisi e limitati all'esterno, verso l'occhio, da una o due pieghe frontali non punteggiate (12).

11). Elitre con strie nettamente incise fino all'apice ⁶⁾. Corpo sup. metallico, elitre con 2 punti setigeri lungo la 3.a stria, pronoto punteggiato; 4.5 - 5.5 mm (*Principium* Mosch.). **94. punctulatum.**

³⁾ Vedi anche *B. Hoffmanni* Net. del M. Biocovo in Dalmazia. Elitre arrotondate, alquanto convesse, con un solo punto setigero circa alla metà della 3.a stria; senza microscultura; corpo ferrugineo.

⁴⁾ Con elitre liscie, lucenti: *B. nigricorne* Gyll., dell'Eur. media. — Elitre zigrinate: *B. ambiguum* Dej., del Mediterraneo.

⁵⁾ Vedi anche *B. (Pogonidium) laticolle* Duft. dell'Eur. media. Corpo sup. arruzzo o verde, pronoto più ampio alla base che al marg. ant.; 5.5 - 6 mm.

⁶⁾ Vedi anche *B. (Paraprincipium) ruficolle* Ill. dell'Eur. media. Corpo giallastro, elitre con due fini punti dorsali nella 3.a interstria, il centro del pronoto non punteggiato; 3.5 mm.