

- Testa e pronoto del medesimo colore, rosso-ferrugineo. Protorace meno cordiforme, elitre allungate e piatte, egualmente punteggiate anche sulle interstrie interne. — 8.
8. Elitre quasi sempre con lunga fascia longitudinale giallastra, senza microscultura tra i puntini piligeri e di conseguenza più lucenti. — Eur. merid.-orient., Asia minore. [lineata Quens.]
- Elitre senza fascia longitudinale, con piccola macchia omerale in gran parte staccata dal margine laterale giallo; la superficie distintamente zigrinata e di conseguenza più opaca. — Europa media, Caucaso. [scapularis Schaum.]
9. Pronoto ampio, lateralmente arrotondato, con larga doccia laterale e punteggiatura diradata sul disco; *elitre con pubescenza eretta*, piuttosto lunga; le due macchie omerali grandi, talvolta estese a tutta la base. L'ultimo art. dei palpi labiali leggermente dilatato nel ♂, assai snello nella ♀. — Eur. settentr., Siberia. [macularis Dej.]
- Pronoto stretto, cordiforme, convesso, con punteggiatura densa e quasi uniforme anche sul disco e con stretto orlo laterale; *elitre con pubescenza breve, depressa*; la macchia omerale non oltrepassa mai, verso l'interno, la 4.a stria dorsale; il capo nerastro, l'ultimo art. dei palpi labiali più fortemente dilatato nel ♂. — Eur. settentr. ed Asia settentr., reg. alpina dell'Eur. media. [angularis Gyll.]
10. Subsg. *Tarus* Motsch. — Elitre brune, pubescenti, la reg. basale più o meno ferruginea. Il capo non ingrossato, gli occhi sporgenti, il primo art. antenn. non distint. incavato; pronoto cordiforme, gli angoli post. grandi e sporgenti; elitre obovate. 470. *vaporarium*.
- Subg. *Menas* Motsch. — Elitre azzurre, violacee o verdastre. Il capo ingrossato, gli occhi nulla affatto sporgenti, il primo art. antenn. leggermente incavato al lato sup.; pronoto subcordato, con gli angoli posteriori piccolissimi; elitre subcilindriche. 471. *variolosa*.

467. **C. (Cymindis s. str.) humeralis** Geoffr. (Schaum 295, Gglb. 412, Reitt. 197 e Reitt. 1923, 4. — Eur. sett. e media). — Da noi sui monti del Goriziano nella reg. dei faggi: S. Lucia-Cobilaglava, a 1300 m. sotto sassi, 6.911 (Pr 1); Selva di Tarnova, nella località di Anska Lazna, in un prato tra i boschi, 5.21 (M 1); Monte Re, 9.24 (R 1). Anche sul Nevoso (Sim). — Carnia: Bosco Bandito sopra Ludaria, 7.25 (Vallon). — Manca certamente nella regione carsica di Trieste e dell'Istria, ove è sostituita dalla specie seguente.

468. **C. axillaris** Fabr. (Ganglb. in Bodemeyer: Quer durch Kleinasiën, 1900, 139; Reitt. 1923, 5; *axillaris* pars, Ganglb. 412; *homagrica* Duft. Fn. Austr. II, 1812, 240. — Eur. media e reg. mediterr.). — Nel nostro territorio avviene il passaggio dall'*axillaris* typ. dell'Eur. centr. alla sbps. adriatica della Dalmazia.