Il territorio dell'*A. Eccheli* abbraccia anche il complesso del M. Cavallo nelle Alpi Venete, ove esso è rappresentato da una razza alquanto diversa, sbsp. *venetianus* m. Questa razza, di statura più ampia e dalle spalle molto angolose, ricorda nell'aspetto esteriore il *Beckenhaupti albiensis*, ma ne differisce per il pene foggiato come nell'*Eccheli*, vale a dire coll'apice molto corto.

Io ritengo infine che alla specie *Eccheli* sia da ascrivere, come razza, anche l'*A. teriolensis* Schaub. dei Monti Lessini, sebbene l'apice del pene sia un poco più lungo. Le zampe rosse lo distinguono sufficientemente da tutte le altre razze dell'*Eccheli*.

Gen. *Molops* Bonelli.

Abbrev. — Ganglb. 1889 = GANGLBAUER, Revision der *Molops*-Arten. (Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, 113-125).

1. Specie grande (16-21 mm); pronoto trasversale, i lati poco arrotondati e poco ristretti verso la base, il solco basale esterno dista dal margine laterale quasi tanto quanto dal solco basale interno; elitre ampie, subsparallele, gli omeri quasi rettangolari.

388. *striolatus*.

— Statura di solito minore. Pronoto cordiforme e più ristretto verso la base; il solco basale esterno vicinissimo al marg. laterale. — 2.

2. L'apice del pene (cioè la parte situata dietro l'orificio) brevissimo, non più lungo che largo, colla punta arrotondata o smussata. L'ottava e la nona interstria delle elitre di solito molto strette, i punti della serie ombelicata poco appariscenti. — 3.

— L'apice del pene forma un triangolo allungato, colla punta diritta oppure ricurvata a destra (in visione dorsale). L'ottava e la nona stria di solito meno strette e la serie ombelicata formata da punti più grandi e rotondi. — 5.

3. Specie tozza, cogli angoli post. del pronoto piccolissimi, l'orlo laterale della fronte dinanzi agli occhi debolmente ingrossato; la 7.a interstria più larga della 6.a; lungh. 14-18 mm. 390. **simplex**.

— Gli angoli post. del pronoto più grandi; l'orlo laterale della fronte spesso fortemente ingrossato e sporgente dinanzi agli occhi. — 4.

4. Specie più convessa e meno allungata; gli occhi più sporgenti, le elitre più o meno ovali, con striatura variabile, la settima interstria nella metà ant. di solito più larga che la sesta; 10.5-15 mm.

393. *ovipennis*.

— Specie di statura allungata e *appiattita*; gli occhi meno sporgenti, il pronoto di solito più dilatato all'innanzi; le elitre allungate, con striatura sottile e interstrie pianeggianti, la settima interstria non più larga della sesta; 12,5-17 mm. 392. **longipennis**.

5. L'apice del pene diritto o lievemente ricurvo in tutta la sua lunghezza; gli angoli post. del pronoto piccolissimi. — 6.

— L'apice del pene colla punta ricurva a becco e spesso leggermente contorta; gli angoli post. del pronoto più grandi. — 8.