

127. **B. elongatum** Dej (Spec. V, 148, *tipi*: Spagna e Francia mer.; Schaum 692, Bed. 30, Ganglb. 168, Reitt. 119, Müll. 107; *elongatum* pars, Bed. N. Afr. 60 e 67. — Eur. mer. e occid., Asia min. e Cauc.). — Lungo l'Isonzo e gli altri fiumi che sboccano nel Golfo di Trieste, III-V e VII, VIII, piuttosto raro. — Podgora, Boschinis, Peuma e Groina pr. Gorizia (Schr); Is. Morosini (May). — Lungo il Timavo sup. a Mali Pristava (Sch) e Loke (Gab); presso Zaule (Cz 1) e al Risano (Ch e Ku 2). — Dint. Fiume: Val Recina (teste Mey).

128. **B. (Pseudolimnaeum) Doderoi** Ganglb. (Wien. ent. Zeitg. 1892, 314, tipo: Alpi occid., Val Pesio; Müll. 108. *B. viridimicans* Dan., Col. Stud. II, 1898, 63, *tipi*: Alpi or. e Transilvania. — Distrib.: Alpi, Appennino, Carpazi). — Di questa specie, relativamente frequente nel fogliame fracido, bagnato, lungo i rigagnoli delle vallate boschive della Stiria a nord di Graz, non consta finora che un solo es. della nostra reg.: Aidussina (leg. Bianchi, cf. *Net.*, Wien. ent. Zeitg. 1909, 9). — Trovasi anche in Carnia, rarissimo: tra Rigolato e Forni Avoltri 1924 (Vallon 1); e in Carniola: Bochinia 1895 (Ganglb 1, sec. *Daniel*, l. c.).

129. **B. inustum** Duv. (Ganglb. 168, Dan. Col. Stud. II, 64, Müll. 108. — Eur. occ. e centr.). — Rarissimo a Trieste lungo il ruscello del Boschetto, sotto pietre 6.909 (Ciana 1) e 4.911 (Borghi 1). — Dei dint. di Gorizia mi constano 3 es. presi una trentina di anni fa vicino all'Isonzo (teste Penecke) ed uno della coll. Schreiber. Recentemente il dott. Ravasini ne raccolse uno nella Selva di Tarnova, 6.23. — Oltre confine: Bochinia, lungo la Savizza 1907 (Moczarski 1, determ. Gglb.).

130. **B. (Limnaeum) nigropiceum** Marsh. (Gglb. 176, Bed. 36, Müll. 109. — Coste dell'Atlantico e del Mediterr.). — Specie alofila, probab. diffusa lungo le coste istriane in siti adatti; vive nell'arena grossolana alla spiaggia del mare. — Sistiana 7.19 (Gr 1) e 7.26 (Siega, plur.); alle sorgenti d'Aurisina, 3.22 (R 2); Valle d'Oltra, 3.14 (Pr, plur.); Pola (Kfm 1).

131. **B. (Diplocampa) fumigatum** Duft. (Schaum 736, Ganglb. 173, Reitt. 121, Müll. 63. — Eur., Siberia). — Da noi un'unica volta a Lucinico pr. Gorizia, 10.4.93 (Schr 6). — E' rarissimo anche in Dalmazia, ove trovasi alla foce del Narenta, presso Metkovic.

132. **B. assimile** Gyllh. (Schaum 734, Ganglb. 173, Reitt. 121, Müll. 63. — Eur., Siberia, Algeria). — Da noi finora sing. es. in poche località: Caorle alla foce della Livenza 7.25 (S 1); Podgora pr. Gorizia, 4.93 (Schr 1); Valle del Quieto inf. 4.23 (S 1); Veglia 5.08 (Net.).

133. **B. (Talanes) aspericolle** Germ. (Schaum 713, Ganglb. 169, Reitt. 114, Müll. 111. — Su terreno salmastro e alla spiaggia del mare in Francia, Germania, Italia, Ungheria, Russia mer., Turkestan). — Da noi rarissimo, Friuli: Grado (Bernh 1). — Istria: Zaule, verso sera a volo, 4.8.911 (Gr 1); Valle del Quieto inf., 5.23 (Ch 1). — E sostituito in Dalmazia e in Balcania dalla specie affine *subfasciatum* Chaud.