

— Le antenne nere e anche le zampe molto scure. Corpo nero, leggermente metallico, elitre con disegno giallo simile alla specie precedente, però le macchiette nella metà ant. più numerose e spesso confluenti; 2.7 - 3 mm.

143. *maculatum*.

90. **B. (Bracteon) foraminosum** Sturm (Schaum 677, Ganglb. 155, Reitt. 106, Müll. 55, — Eur. centr. mont.). — Goriziano e Friuli: Podgora e Boschinis pr. Gorizia, all'Isonzo, 8.90 e 4.93, com. (Schr); Is. Morosini 5.03 (May 1); Lago di Doberdò 4.05 (M 1).

91. **B. (Chlorodium) splendidum** Sturm (Schaum 689, Ganglb. 156, Reitt. 107, Müll. 56, — Eur. media e orient., Balcania, Asia min.). — Lungo l'Isonzo inf.: Podgora e Boschinis pr. Gorizia, IV, V, 90 e 91, com. (Schr); Is. Morosini 5.914 (May 1).

92. **B. (Metallina) pygmaeum** Fabr. (Schaum 718, Ganglb. 156, Reitt. 107, Müll. 58, — Eur. sett. e media). — Lungo l'Isonzo, IV-VII, e X, raro: Sonzia, Tolmino, Podgora, Boschinis, Sagrado e Is. Morosini; anche alla spiaggia di Bestrigna, insieme con altri coleott. ripicoli, trasportati dalle acque. — Carnia: Tolmezzo (*Gortani* 60); Claut 8.26 (Spr). — Tutti i nostri es. appartengono alla f. typ., senza macchia gialla sulle elitre; colorito normale, bronzee, tranne 1 es. nerastro dell'Is. Morosini.

93. **B. lampros** Herbst (Schaum 716, Ganglb. 157, Reitt. 107, Müll. 58, — Eur., Asia occid.). — Nel nostro territorio ambedue le razze:

a) *lampros properans* Steph. — Forma primitiva, con 7 strie dorsali sulle elitre; statura media maggiore. Vive spec. nella zona bassa e litoranea e in pochi punti del retroterra, fino ai 600 m. Trovasi sotto sassi in siti umidi, al margine di pozze melmose, talvolta com., III-V. — Friuli: Palmanova, Udine. — Goriziano: Vertoibizza (Gorizia), Lago di Doberdò. — Zona costiera: Trieste (Rojano e Boschetto), Salvore, Pola. — Retroterra triestino e istriano: Comeno, Senosecchia, Matteredia.

b) *lampros lampros* s. str. — Forma derivata, con 6 strie dorsali; statura di solito minore. Manca affatto nella zona litorale; predilige località più alte della zona submontana, montana ed alpina, dai 300 ai 1000 m. Trovasi nel fogliame dei boschi, delle doline e sotto i sassi, fin sulle vette dei monti; III-X, com. — Friuli e Carnia: Magnano pr. Tarcento, Masarolis pr. Cividale, Ludaria, Bosco Bandito, M. Crostis, M. Talm, M. Raut. — Goriziano: Monte Sabotino, Selva Tarnova (Ciaun, Nemci, Loqua), Volzano, S. Lucia, Mataiur, M. Nero di Tolmino, Porezen, Wischberg (fino a 2000 m). — Retroterra di Trieste: Opicina, Banne, Percedol, Orleg, Lipizza, Castellaro Maggiore, Roditti-Artuise; Aidussina, Monte Re. — Retroterra istriano: M. Taiano, Levade, Lupolano, M. Maggiore. — Retroterra fiumano: Viševica, Zlobin, Obruč, Valle Kostajnovica, Grohovo.