

- Pronoto trasversale, la base quasi liscia; elitre col solito punto impresso nella 3.a interstria; corpo nero o piceo, più convesso (*Haploharpatus* Schaub.) — 86.
86. Antenne giallo-rossicce. Statura minore, corpo convesso, le tibie ant. senza prolungamento lobiforme; all'apice; 7 - 9.5 mm. — Eur. settentrionale e media. [Fröhlich Sturm.]
- Antenne annerite verso la base, anche il primo articolo più o meno nerastro; statura maggiore. — 87.
87. Le tibie ant. semplici. Corpo convesso, pronoto ai lati meno arrotondato, nella metà basale quasi parallelo, con angoli post. perfettamente retti; la doccia laterale del pronoto meno ampia, le antenne meno scure; 12 - 14 mm. — Russia mer., Eur. centr. [zabroides Dej.]
- Le tibie ant. con prolungamento lobiforme all'apice esterno. Corpo più largo e meno convesso, i lati del pronoto più arrotondati, con larghissima doccia laterale; le antenne molto scure; 13 - 14 mm. — Eur. sett. e media. [hirtipes Panz.]

227. **H. (Ophonus) sabulicola** Panz. (Schaum 572, Bed. Col. Seine 71, Ganglb. 342, Reitt. 168, Reitt. Tab. 60. Razze: Schaubeger, Col. Zentralblatt 1926, 156. — Eur. media e merid., Asia minore). — Da noi esclus. nella zona litorale, ove trovasi anzitutto la seguente razza:

a). *sabulicola columbinus* Germ. (Ganglb. 342 e Schaubeger 158; *Car. columbinus* Germ. Reise Dalm. 197; *Harp. columbinus* Dej. 193; *Ophon. columbinus* Küst. I, 8. — Balcania, Italia sett. e media). — Nella reg. costiera della V. G., da Duino al sud, abbastanza raro, di preferenza su terreno calcareo, asciutto; più frequente in Dalmazia. — Costiera di Trieste: nel Parco di Duino, sotto sassi 6.20 (M 2); Sistiana, 1 es. volato al lume di notte, 7.25 (Sch); S. Croce-Miramare, sotto sassi, 24.4.04 (Cz 1); S. Sabba 6.02 (Str 1). — Istria: Umago, nel terriccio tra gli olivi, 3.21 (R 1); Cittanuova 5.23 (Mancini); Orsera, negli oliveti, 6.910 (Stussiner 2); Pola (Steinb. 6); Chersano-Fianona 5.04 (M 1); Fiume 4.97 (Langhoffer 53). — Isole: Lussin 903 (Kalmann) e Unie (Rueconich 1).

b). *sabulicola* sbsp. — Nell'isola di Arbe, 9.910, è stato trovato un es. che differisce dal *columbinus* per statura minore ed il pronoto meno dilatato e meno arrotondato ai lati. Non avendo più a disposizione quell'es., non posso stabilire la razza secondo la nuova disposizione dello Schaubeger (1926); però si tratta certamente di una forma piuttosto continentale, la quale si avvicina alla *f. typ.* dell'Eur. media oppure alla sbsp. *ponticus* Schaub. della Pannonia e dei dintorni di Vienna.

228. **H. diffinis** Dej. (Spec. IV, 196, Schaum 573, Ganglb. 342 e Schaubeger, Col. Zentralblatt 1926, 159; *diffinis* f. typ. Reitt Tab. 60 e Bedel N. Afr. 139. — Balcania, Ungheria, Austria (al nord fino Vienna), Italia, Francia e Inghilterra). — Trovasi nelle vallate alluvionali