

ineguale e meno densa. Sembra che anche gli es. di Trieste e dell'Istria, siano più affini alla v. *dalmatinus* che alla f. typ.; però lo scarso materiale di cui dispongo non mi consente ancora una separazione sicura delle due forme.

511. **H. decoratus** Gyll. (Eur. sett. e media, Siberia). — Sarebbe stato trovato, secondo un'indicazione del defunto SCHREIBER, a Podgora pr. Gorizia. Io non ho veduto i rispettivi esemplari.

Gen. *Hydroporus* (Clairv.) Zimm. 1919.

Nota. — ZIMMERMANN (Arch. Natg. 1919, 154) ha ristretto il genere *Hydroporus* alle specie colle lamelle interne delle anche posteriori troncate trasversalmente all'apice, vale a dire alle specie contenute nell'opera del Ganglbauer dal n. 22 in poi. Restano escluse in tal modo le specie del gruppo *meridionalis* e *lineatus*, le quali vengono considerate da Zimmermann come facenti parte del gruppo *Graptodytes*, ad onta della mancanza della stria laterale sul pronoto.

Le specie del gruppo del *planus* non si possono classificare con sicurezza colle opere generali finora in uso. ZIMMERMANN (l. c.) ha messo in rilievo l'importanza della microscultura per la distinzione delle specie affini al *planus*. Trattandosi di caratteri nuovi o finora poco noti, ho ritenuto opportuno rifare la tabella del Ganglbauer (Käf. Mitteleur. pag. 459) dal n. 35 impoi:

35. Tutto il pronoto zigrinato tra la punteggiatura. — 36.
— Il pronoto almeno nel mezzo o dinanzi allo scutello liscio, lucente, senza zigrinatura. — 40.
36. Specie lunga 5 mm. Elitre più convesse, fortemente punteggiate, senza traccia di punti maggiori disposti in serie. Il capo rossiccio almeno al margine ant. e post., il pronoto piceo, coi lati talvolta rossicci, le elitre brune, alla base e ai lati di una tinta più chiara, giallo-bruna. 512. **rufifrons** Duft.
— Statura minore e meno convessa, lunghezza al massimo 4 mm. Elitre meno fortemente punteggiate, di solito con due o tre serie di punti maggiori. — 37.
37. Il capo al margine ant. e post. rossiccio, anche i lati del pronoto più o meno rossicci; le elitre macchiate di giallo agli omeri e talvolta anche alla base presso lo scutello. Specie simile al *planus*, però tutta la parte sup. del corpo distint. zigrinata e statura minore; lungh. 3,3 mm. — Isola Flores (Azzore), nel lago di un cratere vulcanico ¹⁾. [Guérnei Rég.]
— Il capo e il pronoto completamente neri. — 38.
38. Le elitre alla base e ai lati con disegno giallo evidente. — 39.
— Elitre complet. nere, di rado brune o con macchie rossicce. — 46.

¹⁾ Gli esempl. segnalati dalla Francia mer. col nome di *Guérnei Rég.* (vedi Chobaut, Bull. Soc. ent. France 1905, 156) sarebbero, secondo Bedel (Cat. Col. Nord-Afr. 353, nota) una specie diversa e precisamente l'*H. limbatus*.