

320. **A. nitida** Sturm (Schaum 525, Putz. 20, Ganglb. 317, Reitt. 161. — Eur. sett. e media, Siberia). — Esclus. nel retroterra montano, V - IX, per lo più sing. es. — Carnia: da Tolmezzo in sù (*Gortani* 61); Villa Santina, Bosco Bandito, Ludaria (Vallon), Pontebba, Paularo (Gagliardi). — Goriziano: Mataiur (vetta), Selva Tarnova. — Istria montana: M. Taiano, alla fine di maggio (R, Sch). — Alpi liburniche: Nevoso (Sch 1); Fužine (*Kuthy* 35).

L'ab. *imbella* Reitt. (senza poro ombelicato alla base della stria scutellare) mi consta dalle seguenti località: Carnia: Paularo, Ovaro e Frattis (Gagliardi). Selva Tarnova (R 1). Retroterra di Trieste: Cosana (Kodric 1). Istria: Taiano. Liburnia: Bosco del Bitoraj (Dep 1).

321. **A. communis** Panz. Bed. 91, Ganglb. 317, Reitt. 161. — Eur. sett. e media, Caucaso, Siberia). — Nel nostro retroterra montano, V - VII, abbastanza rara; eccezionalmente nella pianura friulana, forse portata giù dalle acque. — Goriziano: Mataiur, Selva Tarnova, Chiapovano; in pianura a Muscoli, lungo un sentiero campestre, 4.18 (Angerer 1) e Monfalcone 4.20 (R 1). — Retroterra mont. di Trieste e dell'Istria: Monte Re, Prevallo, Auremiano, Taiano, M. Maggiore. — Retroterra liburnico: Fužine, Vrata.

322. **A. convexior** Steph. (Bed. 91, Ganglb. 317, Reitt. 161; *communis* auct. ex parte. — Eur. sett. e media). — Come la precedente quasi esclus. nel nostro retroterra montano, però meno legata alla zona del faggio, trovandosi anche sull'Altipiano di Trieste; la comparsa alla spiaggia di Monfalcone è prob. accidentale e dovuta a trasporto colle acque dall'interno del Goriziano. — Carnia: M. Crostis (Vallon). — Goriziano: Mataiur, vetta, 7.24 (M 1); S. Tarnova, Kucelj, 6.12 (Pr 1); Monfalcone, alla spiaggia oltre Bestrigna 5.25 (Spr 1). — Retroterra di Trieste e dell'Istria: Conca di Orleg 21.3.20 (Ch 1); Lipizza 19.3.20 (M 1); Castellaro 10.24 (Sch 2); Roditti 4.911 (Spr 1); M. Taiano, 26.5.21 Me R 3).

323. **A. lunicollis** Schioedte (Schaum 528, Bed. 91, Ganglb. 317, Reitt. 162; *vulgaris* Panz. Dej. III, 463, Putz. 18. — Eur. sett. e media, Caucaso, Siberia). — Rara nel nostro retroterra montano. — Carnia: Forni Avoltri (Dep 1), M. Talm 7.25 (Vallon 1). — Goriziano: M. Canin (*Krauss* 1902, 102); Selski Kal 5.04 (Schr 1). — Liburnia: Nevoso 7.20 (R 1); coll. Hoffmann (*Dep.* 1913, 47).

Distinguesi facilmente da tutte le specie precedenti per le antenne più o meno annerite dal secondo articolo impoi e le tibie nerastre.

324. **A. curta** Dej. (Schaum 527, Bed. 91, Putz. 22, Ganglb. 318, Reitt. 162. — Eur. sett. e media, Siberia). — Nel nostro retroterra mont., spec. diffusa nella zona subalpina; eccez. nella zona carsica (Lipizza), V - VIII. — Carnia: Forni di Sopra, Paluzza, Timau (*Gortani* 61); M. Crostis, Bosco Bandito (Vallon); Val Pesarina e Paularo (Gagliardi). — Goriziano: Porezen, Plezzo, Selva Tarnova, Selski Kal. — Retroterra di Trieste: Monte Re, Vipacco, Aidussina; Lipizza 5.21 (Sauli 1). — Liburnia: Nevoso, Lisina, M. Maggiore, Klek, Obruc, Sgornicko, Zlobin, Lic.