

Per Abbazia Tripold ci riferisce anche i giorni di mare mosso che sono precisamente 112 all'anno in media :

31 giorni nell'inverno	20 giorni nell'estate
21 » nella primavera	30 » nell'autunno

Misurazioni ozonometriche.

Dati sulle intensità ozonometriche abbiamo solo per Lussino. La maggior intensità si trova nell'inverno, segue poi la primavera, quindi l'autunno e poi l'estate.

Medie ozonometriche (1887-1894) per Lussino secondo la scala 1-14

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Anno
10.4	10.3	10.6	10.2	9.4	8.4	7.9	8.1	9.3	9.7	9.7	10.3	9.5

Mancano invece studi sullo stato elettrico dell'atmosfera e sulla ionizzazione dell'aria che tanta importanza hanno nel meccanismo di produzione della ciclonopatia, studi che converrebbe promuovere.

Il mare.

L'Adriatico che lambisce le nostre spiagge è, come noto, il mare più ricco di cloruro sodico.

Una analisi di acqua di mare prelevata presso Abbazia dal Buchner diede il seguente risultato :

In un litro d'acqua di mare sono contenuti :

29.027	grammi di cloruro sodico
0.520	» » bromuro »
1.046	» » cloruro di potassio
3.073	» » » di magnesia
2.554	» » solfato di »
1.154	» » » di calcio
0.381	» » carbonato di calcio
0.010	» » acido silicico
0.045	» » sostanze organiche
37.810	

Un'analisi dell'acqua di mare prelevata nella Valle di Sicciolle presso Portorose ha dato :

Peso specifico a 20 gradi 1.027 — a 15 gradi 1.028
in 100 parti

H ₂ S O ₄	0.234	Na	1.106
Cl	2.004	O (combinato)	0.049
Br	0.07	C O ₂	0.010
I	-0	C O ₂ (semicombinato)	0.005
Ca	0.041	Sali sospesi e sostanze insolute	-0
Mg	1.147	Somma del residuo solido	3.620
K	0.021	H ₂ O	96.380