

	Temperatura media diurna		Deviazione dalla media normale	
	22 gennaio 1907	23 gennaio 1907	22.1	23.1
Gorizia	- 8.2	- 7.4	11.6	10.8
Barcola	- 8.0	- 8.9	13.3	14.2
Trieste	- 9.7	- 10.6	14.4	15.3
Pisino	- 7.9	- 8.3	8.8	9.2
Pola	- 6.2	- 6.0	13.2	11.9
Apriano	- 10.9	- 11.5	14.3	14.9
Abbazia	- 5.3	- 6.7	10.7	12.1
Lussinpiccolo . .	- 2.0	- 1.3	9.5	8.1

Temperature sopra 25 gradi e giornate estive.

Temperature sopra 25 gradi in alcune ore del giorno possiamo avere ad Abbazia come a Lussinpiccolo dal maggio al settembre; a Lussinpiccolo eccezionalmente anche in ottobre.

Nubilità.

La nubilità media annua è nella zona marittima adriatica di 4.30.

La massima nubilità danno ad Abbazia l'ottobre (5.2), il marzo (5.1) ed il novembre (5.0); la minima il luglio (2.8) e l'agosto (2.5); la nubilità è ancor minore a Lussinpiccolo con il massimo (5.1) nel dicembre e nel gennaio, il minimo (2.1) e (2.2) nel luglio e nell'agosto.

Il maggior numero dei giorni coperti si ha ad Abbazia nel dicembre (7.4), nel marzo (7.2), nel gennaio (7); a Lussinpiccolo nel dicembre (8.5), mentre il luglio e l'agosto hanno un maggior numero di giorni sereni tanto ad Abbazia che a Lussinpiccolo, qui in proporzione un pò maggiore.

La serenità del cielo è una fra le tante condizioni che concorrono alla mitezza della stagione invernale. La tinta del cielo è generalmente cerulea; i tramonti assumono una imponente magnificenza per i toni caldi ed infocati.

Confrontando la nubilità delle due nostre principali stazioni climatiche balneari dell'Istria con quella di Madera noi vediamo che Lussinpiccolo ed Abbazia hanno durante l'anno il cielo meno nuvolato di Gorizia e che la nubilità di Lussinpiccolo è ancora inferiore a quella di Madera e quasi pari a quella di San Remo.

Nubilità per

Abbazia	4.3	San Remo	3.9
Fiume	5.4	Pola	4.5
Gorizia	5.2	Trieste	5.3
Madera	4.6	Davos	5.2
Lussinpiccolo	4.0	Zurigo	6.3