

TABLEAU DE LA MORTALITÉ EN MACÉDOINE IOUGOSLAVE
(MOYENNE 1920-1926)

ARRONDISSEMENTS	PRINCIPALES RÉGIONS NATURELLES	TAUX (‰/‰)
Stroumitsa	Vallée de la Stroumitsa et cadre montagneux	32
Vélès	Babouna ; monts et défilés du moyen Vardar	28
Kavadartsi.	Plaine du Tivkech et monts de la Nitcha	24
Chtip	Vallée de la Brégalnitsa inférieure.	23
Kotchané	Vallée de la Brégalnitsa moyenne	23
Strouga	Plaine N. du lac d'Okhrid et défilé du Drin.	23
Djevdjélia.	Défilé de Démir-kapou, bassin de Guevguéli	21
Bérovovo	Haute vallée de la Brégalnitsa	20
Débar.	Bassin de Débar dans la vallée du Drin.	19
Koumanovo	Seuil de Koumanovo, vallée de la Ptchinia, et Montagne Noire de Skoplié	19
Négotine	Monts de la rive gauche du moyen Vardar.	19
Kriva Palanka.	Hautes vallées de la Ptchinia et de la Kriva	18
Rostoucha.	Vallée de la Radika, Korab et pays des Miiatsi	18
Valandovo.	Bassin de Valandovo et pentes N. de la Bélachitsa.	18
Gostivar.	Haute vallée du Vardar (S. du bassin de Tétovo)	17 ¹
Kitchévo	Vallée de la Treska (Poretché)	17
Kratovo.	Ossogovo	17
Radovichté	Malech et haute vallée de la Stroumitsa	17
Morikhovo.	Gorges de la Tserna et cadre montagneux.	16
Tétovo	Haute vallée du Vardar (N. du bassin) et Char	16
Brod	Vallée de la Treska et Vodnjanska planina.	15
Prilep.	Pélagonie septentrionale et cadre N. et E.	15
Krouchévo.	Cadre O. de la Pélagonie septentrionale	14
Okhrid	Stogovo.	14
Skoplié	Bassin de Skoplié et cadre montagneux	14
Svétí Nikola.	Plaine de l'Ovtché polié	14
Ressan	Plaine N. du lac de Prespa et pourtour.	13
Bitolj	Pélagonie centrale et cadre O. (Baba).	12
Tsarévo Sélo.	Haute vallée de la Brégalnitsa et Ossogovo	11

A côté du paludisme on enregistre la plupart des maladies contagieuses ou endémiques, avec une forte proportion de morts. A Skoplié, sur 39 malades atteints de fièvre typhoïde en 1927, il n'y a eu que 2 morts, soit une proportion relativement faible de 5,1 %. C'est qu'ici le médecin est installé à demeure. Mais dans le département, cette même année, il y a eu 156 cas et 16 morts, soit 10,2 %, et dans nombre de villages les malades se cachent encore. Ce sont au reste surtout les enfants qui sont atteints, et particulièrement de cinq à dix ans. La scarlatine est un véritable fléau : en 1927, 33 morts sur 124 cas à Skoplié, soit 26 %, 71 morts sur 322 dans le département, soit 22 %, 67 morts sur 303 cas dans la circonscription sanitaire de Bitolj, soit 22,1 %. La diphtérie ne tue pas moins : par exemple 25,4 % des cas déclarés dans le département de Skoplié. La grande quantité de chiens de bergers, animaux encore très féroces, entraîne un nombre considérable de cas de rage, 382 dans le ressort de l'Institut d'hygiène de Skoplié en 1927 ; mais ils ne sont plus mortels. Enfin les vénériens sont en foule : en 1927 l'Institut d'Hygiène de Skoplié n'a pas procédé à moins de 63 321 consultations (maladies cutanées et vénériennes), à moins de 18 238 examens vénériens. Que dire de la tuberculose, dont on commence seulement à dresser des statistiques ? La mortalité tuberculeuse atteint encore 45 % : il n'est pas rare de voir des familles de quinze ou seize enfants réduites à cinq ou six².

1. On sait que c'est à peu près le taux de la mortalité française : 17,5 ‰/‰.

2. Chiffres extraits du rapport du D^r RANKOV, déjà cité.