

Desso produce maggior numero di getti dalla radice; è più resistente della robinia, e le sue foglie servono di nutrimento ad una specie di baco da seta (*Bombyx cinthia*) il di cui prodotto, quand' anche di valore inferiore a quello del baco comune (*Bombyx mori*) ha pure un' avvenire sicuro, subito chè riescirà di trovare il modo indicato pella filatura.

La robinia, (volgarmente chiamata acacia) serve in ispecie a pali di viti, che sono di grande durata, come in generale il suo legno resiste molto alla putrefazione.

Ottenuto in tal modo l' imboscamento, dovrà trattarsi il bosco secondo il sistema ceduo, almeno nei primi 20 anni, imperciocchè con esso viene molto agevolata la foltezza del bosco, mediante innumerevoli polloni che si producono dalle radici dopo tagliate le piante, di guisa chè il bosco diviene in pochi anni impenetrabile.

L' età confacente pel primo taglio è quella da 8 a 10 anni, allorquando cioè le piante hanno raggiunto dimensioni sufficienti da offrire qualche utile.

In capo a qualche decennio, essendosi formato uno strato di terriccio vegetabile mercè le foglie cadute a terra, e putrefatte, potrassi passare all' introduzione di altre specie di piante più pregiate, le quali richiedono pella loro vegetazione un terreno più fertile e fresco di quello esistente in origine, ciocchè si ottiene appunto dal terriccio stesso.

Trattandosi invece di educare direttamente una data qualità di legname o di altri prodotti boschivi, convien scegliere quella specie di piante che sono atte a tale scopo, avuto riguardo al clima, al suolo, ed alle altre circostanze, come più sopra fu esposto.