

Num. approssimativo
delle sementi contenuto
per un funto.

	Staja	funti	
Abete rosso (piceo)*)	$\frac{4}{5}$	22	6000
" " " **)	$\frac{1}{5}$	15	75000
Pino austriaco **)	$\frac{1}{5}$	20	40000
Pino Comune **)	$\frac{1}{4}$	16	75000
Pino marittimo **)	$\frac{1}{5}$	20	60000
Pino pinocchio (pi- gnoli)	$\frac{1}{4}$	20	60000
Larice **)	1	80	800
Ailanto **)	$\frac{1}{4}$	18	77000
	3	60	46000

Ove la seminazione non segue a pieno campo ma soltanto a singole striscie o macchie, la quantità sopra esposta dev'essere proporzionatamente ridotta, aumentando però di un terzo la quantità in tal modo risultante, avvegnacchè il numero delle pianticelle deve essere relativamente maggiore nel caso di una seminazione parziale in confronto alla totale. Se p. e. la seminazione venisse praticata a macchie, ognuna delle quali avesse l'estensione di due piedi per ogni lato, cioè 4 piedi quadrati, o la distanza tra loro fosse 4 piedi, in tal caso la superficie da seminarci sarebbe 6400 piedi ossia 178 klafter quadrati, pari ad $\frac{1}{9}$ di jugero che contiene 1600 klafter quadrati. Volendosi seminare delle ghiande di rovere occorrerebbero perciò $4 \times \frac{1}{9} \times 1 \frac{1}{3} = \frac{6}{10}$ di stajo o 60 sz all'incirca; di frassini $2 \times \frac{1}{9} \times 1 \frac{1}{3} = \frac{3}{10}$ stajo ossia 9 funti; di pino marit-

*) con membrane

**) senza membrane