

gli animali grossi e caprini pel alcuni anni susseguenti all' esecuzione del taglio.

Questo è l' unico mezzo per salvare siffatti boschi, i quali in caso diverso devono del tutto deperire, ed allora cesserà non soltanto qualsiasi rendita di legna, ma anche il suolo diverrà sterile o meno produttivo.

In quanto all' Istria, questa possiede fortunatamente ancora alcuni boschi d' alto fusto (oltre ai boschi erariali che vengono amministrati da impiegati tecnici-forestali) e ciò specialmente le comuni Castelnuovo e Castua, pei quali le regole suesposte possono servire.

B. *Trattamento dei boschi cedui.*

Il trattamento dei boschi cedui è assai più semplice di quello dei boschi d' alto fusto pel motivo che la riproduzione non richiede tante, diverse precauzioni, ed il turno dell' utilizzazione è molto più breve.

Tra le piante europee soltanto quelle a foglia larga hanno la particolarità di riprodurre nuovi getti dalle ceppaje e radici; quelle a foglie lineari, come il pino, abete, larice, cipresso ecc, non possono invece essere riprodotte che mediante semeuti.

Tra le prime sono alcune che si riproducono soltanto dalle ceppaje (guercia, faggio, elice, frassino, olmo) altre soltanto o preferentemente dalle radici, (alcune specie di pioppo e l' ailanto), altri tanto dai ceppi che dalle radici (acacia, alcuni pioppi, ontani, carpini).