

per purificare il sangue; 3.<sup>o</sup> *tusilla* o *contrayerva*, radice febbrifuga e diaforetica; 4.<sup>o</sup> *zarzaparilla* (*salsapariglia*) che abbonda sulle sponde ombreggiate dell'Oronoco, ed adoprasì, come è a tutti noto, in qualità di rimedio contra le malattie veneree, i reumatismi, ecc.; 5.<sup>o</sup> *jenxibre* o *zenzero*, usata come antiscorbutico e per facilitare la digestione, trovasi in vicinanza alle sponde dell'Oronoco; 6.<sup>o</sup> l'*anil* od *indaco*, al dir di Gumilla, così abbondante, quanto i bronchi e gli spinii negli altri paesi; trovasi sovente dai lati delle strade.

Le piante generalmente coltivate sono:

1.<sup>o</sup> *Mais*, quattro o cinque specie; 2.<sup>o</sup> cipolle tre o quattro specie; 3.<sup>o</sup> meloni, meloni d'acqua (*sandias*); 4.<sup>o</sup> patate, varie specie; 5.<sup>o</sup> piantaggini, quattro specie; 6.<sup>o</sup> piñas ed ananas; 7.<sup>o</sup> tabacco; 8.<sup>o</sup> canna di zucchero; 9.<sup>o</sup> *mapuyes*; 10.<sup>o</sup> nami, ignami (*dioscorea sativa*); 11.<sup>o</sup> *pirichas*, due specie; 12.<sup>o</sup> *canna dulce*; 13.<sup>o</sup> *yucca*, o *cassava* (*yac-tropha manihot*); 14.<sup>o</sup> cacao, albero carico di fiori e di frutta in tutte le stagioni; 15.<sup>o</sup> albero del pane (*artocarpus incisa*), ch'è stato introdotto dalle Antille (1).

*Elenco degli animali, dei rettili ed insetti i più osservabili della Guiana spagnuola.*

*Scimmie.* Sonvi varie specie (2) di questi animali che differenziano tanto nella grandezza come nel colore. Esse si nutrono di frutta selvatiche, datteri, *narangillas*, *guamas*, *guaymarros*, ecc. I missionarii aveano cura di osservare quali frutta mangiavano le scimmie, a fine di usarne essi medesimi senza pericolo. La specie chiamata *aragua-ta*, che frequenta le eminenze fertili ed ombrose, è della grandezza di una lepre con una barba simile a quella di un becco.

*Daini.* Ve ne sono due specie che rassomigliano a

(1) Veggasi *Historia Corographica*, ecc., lib. I, cap. 3-6.

(2) De Humboldt ha riconosciuto: 1.<sup>o</sup> la *simia capucina*; 2.<sup>o</sup> *simia betzebuth*; 3.<sup>o</sup> *simia jacchus*; 4.<sup>o</sup> *simia ardipus*; 5.<sup>o</sup> *simia sciurea* o *titi*; 6.<sup>o</sup> *simia lugens* o *viuidita*; 7.<sup>o</sup> *simia trivirgata*; 8.<sup>o</sup> *simia melano-cephala*, o *mono feo*, o *cacao dalla coda corta*, ecc. *Viaggio di d'Humboldt alle regioni equinoziali*, lib. VII, cap. 20-23.