

Verso l'anno 1766 quest'isola fu infestata da una quantità di quegli animali giuntivi dalla terra ferma, e che rapivano i bestiami perfino nelle stalle. Il governatore accordò premii a quelli che ne uccidessero, e si pervenne a scacciarli. Una delle alture dell'isola porta il nome di *Monte delle Tigri*. Il jaguar si trova in tutti i boschi della Guiana, e quand'è affamato, assale tutti gli altri animali ed anche i bovi ed i cavalli.

*Porci*. Se ne distinguono tre specie: 1.° *porco marrone*, o porco d'Europa, divenuto selvatico; 2.° *porco di bosco*; 3.° *pecari*; le quali non differenziano che nella grandezza e nelle abitudini. Se ne mangia la carne, ch'è stimata, specialmente quella del pecari.

*Agouti* (*cavia agouti*, L.), chiamato il coniglio d'America, è della grossezza d'un gatto. Si addomestica facilmente; la sua carne è buona da mangiare, e si rinviene in tutte le parti basse della Guiana.

*Acouchi* (*cavia akuchi*, L.), del genere *agouti*, al quale molto rassomiglia, se non che è più piccolo e d'una carne più succosa.

*Tatuato* (*dasyopus novem cinetus*, L.), o *tatuato* dalle nove bende. Quest'animale non cammina che di notte e si rintana prontamente. La sua armatura resiste alle frecce dei selvaggi.

Un'altra specie, chiamata *tatuato cabassou*, si rintana nelle Morne.

*Coati* (*viverra*, L.). La sua carne offre un ottimo nutrimento.

*Mangia formiche*, il *tamanoir* (*myrmecophaga jubata*, L.), così chiamato perchè si nutre di formiche. I naturali del paese lo chiamano *ouariri*.

Un'altra specie, molto più piccola, è il *formicaio* propriamente detto (*myrmecophaga didactyla*, L.), chiamato dagli indiani *ouatiri ouaou*.

*Timoroso vergognoso* (*bradypus*), *bradge ai* (Desmarts), così chiamato perchè nasconde la testa tra le zampe sotto il ventre.

*Volpe granchivora* (*canis carnivorus*, Geoffroy), così chiamata perchè ama di nutrirsi di granchi.

Si distinguono due altre specie, cioè: l'*ayra* ed il