

---

---

# SAGGIO SULLA FORMA

DELL'

ANNO ATTICO.

---

L'anno attico era luni-solare, cioè avea dodici mesi negli anni comuni, e tredici negli embolismici. Questi mesi chiamavansi 1.° Ecatombeon, 2.° Metagitnion, 3.° Boedromion, 4.° Maemacterion, 5.° Pyanepsion, 6.° Posideon prior, 7.° Posideon posterior, 8.° Gamelion, 9.° Anthèrion, 10.° Elaphebolion, 11.° Munychion, 12.° Thargelion, 13.° Scirrophion. Per tale disposizione de' mesi, l'anno attico aprendosi verso il solstizio di state, il mese embolismico ossia intercalare ricorreva verso il solstizio d'inverno (1).

Seguendo l'oracolo e le leggi, dice Gemino, i Greci regolar dovevano il loro anno dietro il corso del sole, ed i mesi e i giorni dietro quello della luna: per conseguenza essi istituirono l'octaeteride, ossia ciclo di ott'anni, e l'enneadecaeteride o ciclo di sedici anni (Veggasi l'anno olimpico per ciò che riguarda la forma della octaeteride). Ma essendo poi stato riconosciuto erroneo cotesto periodo, Metone, celebre astronomo di Atene, coll'invenzione del suo ciclo credette aver trovato che du-

---

(1) Gemino in Elem. Astron. cap. 6. Petau de doctr. Temp. lib. 2.