

	I	II	III	IV	V	VI
Szombathely	- 2,4	- 0,2	4,1	9,8	14,1	18,9
Budapest	- 2,3	- 0,4	4,4	10,5	15,0	18,7
Kecskemét.	- 3,1	- 0,1	4,1	10,6	15,7	19,5

	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szombathely	19,9	19,0	15,3	9,9	3,7	0,9
Budapest	20,9	20,1	14,0	10,3	4,0	- 1,0
Kecskemét.	22,0	20,6	15,9	10,6	3,6	- 1,4

Precipitazioni. — Più ancora che la temperatura è la piovosità l'elemento che diversifica la Pianura ungherese dalle altre pianure dell'Europa centrale, imprimendo ad essa un carattere di maggiore continentalità. La distanza dal mare e la cintura di montagne che da ogni lato si levano attorno alla pianura permettono infatti solo precipitazioni limitate, che alla loro volta impongono speciali adattamenti alle colture. Il massimo della piovosità si ha già al principio dell'estate (maggio e giugno), col crescer della temperatura, mentre in agosto la piovosità diminuisce; un massimo secondario si ha poi in ottobre e novembre, specialmente pronunciato nella piana tra Danubio e Drava, che sente maggiormente gli influssi mediterranei. Le massime piogge precedono quindi il raccolto del grano, che ha luogo a prin-