

FUNGI

ALII

Campestres si-
ve in pratis na-
scentes non nisi
exactâ aestate,
ibi leguntur pro-
pter odorem, ex
omnibus ii ma-
xime salubres
habentur: et ob
colorem tam su-
pra albenstem
quam infra mi-
nium gratis-
simi aspectus

Super terra { in umbrosis campis
in pratis humectis

Super terra vel
ad extremitates
sylvæ, vel
in harundinum
recessibus sub-
crescentes

quales Fungus Faviginosus, I e II Species,
Lobellii, Mauracher, seu Spitzmorchen vel
Stock-Morgen dicti; nec nisi vere Majo
vel Aprili musco tecti, in sylvis prove-
niunt (caeteris tardius aliquanto pul-
lantibus)

Sylvestres

Super arboribus

{ Quercu
Betula
Corylo
Fraxino

Super aridis lignis
(vel inter spineta
fruticosa)

{ Quercino
Abietino
Betulino

Hortenses

(de his nobis sermo non est)
et qui in pulvinis seruntur

in maceriis, seu parietibus ruinosis
fimetis
musco
foliis arborum aridis
crescentes

Adnascentiae
potius seu vitia
arborum et de-
viationes succi
nutrititii quasi
fungi

{ modo in quercu, et tunc fit planta, toto genere diversa, Viscus
quando vero ab aëre externo lambitur, ac
(Est tamen muscus alius, a pluviis quidem
modo in arboribus caeteris: fit gibber seu tumor morbidus,

Subtus terralatentes, tubera terrae potius quam fungi dicendi, qui in tractationem