

TAVOLA IX.

Calcolo dei quozienti corretti di mortalità della
(Cfr. Tavola
Provincia

Gruppi d'età	Quo- zienti tipo (‰)	Censiti					
		1855	1871	1881	1901	1911	1921
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0 - 5	66,2	57.468	58.213	63.647	81.476	99.113	77.335
5 - 10	5,3	51.524	53.162	55.371	69.799	86.846	86.324
10 - 20	4,1	70.658	89.024	92.673	127.295	121.690	168.377
20 - 40	7,2	122.685	136.983	139.575	143.324	150.640	195.436
40 - 60	12,7	90.925	94.702	101.378	106.720	102.298	123.723
60 - 80	59,4	38.351	36.227	45.939	59.026	61.702	62.903
80 - ∞	256,1	4.053	3.275	3.162	4.623	5.792	5.898
Totali	21,5	435.664	471.586	501.745	592.263	628.081	719.996
	(q _n)	(p ₁)	(p ₂)	(p ₃)	(p ₄)	(p ₅)	(p ₆)

	1856 (*)	1871
Quozienti generici teorici	$q_1 = \frac{m_1}{p_1} \times 1000$ = 22,3	$q_2 = \frac{m_2}{p_2} \times 1000$ = 20,1
Quozienti generici effettivi	$Q_1 = \frac{m_7}{p_1} \times 1000$ = 25,7	$Q_2 = \frac{m_8}{p_2} \times 1000$ = 26,2
Quozienti corretti (M ₁)	$\frac{q_n}{q_1} \times Q_1 = 24,8$	$\frac{q_n}{q_2} \times Q_2 = 28,0$
Quozienti corretti (M ₂)	$\frac{q_2}{q_1} \times Q_1 = 23,2$	$\frac{q_2}{q_2} \times Q_2 = 26,2$

(*) La situazione teorica del 1855 viene assunta come rappresentativa di quella del 1856.