

Potamides pictus var. *mitralis* Eichw.
Terebralia lignitarum Eichw.
Ostrea gingensis Schlth.
Cardium sp. aff. *C. pseudosuessi* Hal.

Terreni litologicamente simili a quello di Krabe sono molto diffusi nella zona collinosa dell'Albania meridionale. Così ad esempio, nelle colline a N di Liusna, poco lungi da questo villaggio, si raccolgono in grandissima abbondanza

Cerithium rubiginosum Eichw.
Potamides pictus var. *mitralis* Eichw.
Potamides tuberculiferus Cocconi.
Ostrea gingensis Schlth.

In entrambe le località, come si vede, all'abbondanza d'individui non corrisponde una relativa frequenza di specie. Però, malgrado la povertà di dati paleontologici, noi crediamo egualmente che i terreni in questione sieno da riferirsi al Sarmatico, poichè essi rappresentano una facies salmastra intercalata tra il Tortoniano marino e il Pontico fluvio-lacustre.

Infatti, allo stesso passo di Krabe, dove la serie stratigrafica si può seguire assai bene, si osserva che i terreni da noi riferiti al Sarmatico ricoprono marne e molasse mioceniche e il Flysch, cioè sedimenti nettamente marini, e vengono alla loro volta ricoperti da conglomerati e sabbie frammiste a ciottoli, materiali che in altra località ci fornirono una fauna pontica.

Da ciò si vede che il nostro riferimento è pienamente riconfermato dalle conclusioni stratigrafiche.

Al Sarmatico è intimamente legato, nella zona neogenica dell'Albania, il Pontico. Questo piano è rappresentato in generale da sabbie giallo-brune più o meno ciottolose, talvolta intercalate a veri banchi di conglomerato. I fossili dimostrano un ambiente di sedimentazione fluvio-lacustre, poichè nella collina di Durazzo, appunto in questo orizzonte, raccogliamo:

Cardium sp. aff. *C. obsoletum* Eichw.
Neritina mutinensis d'Ancona.
Melania tuberculata Müll.
Melania tuberculata var. *granulosa* Bon.
Melanopsis impressa Krauss.
Melanopsis impressa var. *monregalensis* Sacc.
Melanopsis narzolina Bon.
Melanopsis narzolina var. *ecarinata* Font.