

Il Carpione è il pesce che rende famoso questo lago.¹ sopra tutt'altri, pretendendosi che negli altri non siavi. Vi sono però alcuni che vogliono che nel lago di Ocrida nell'Albania ve ne siano, come io nel lago di Zug nell'Elvezia ho trovato pesci molto somiglianti al carpione, specialmente nelle carni rosseggiante, e di un sapore anco più grato del carpione, che non

pregiate per aver troppe spine. Oggi vien detta « Scàrdova » ma in dialetto ancora « Scàrdeva, Scardoa ».

E' esatto che predilige per la frega la palude e il fondo del lago per chè attacca le uova alle canne.

Vive a branchi di migliaja, è assai sensibile al cambiamento di tempo ed è esattissima l'osservazione che durante l'inverno le Scardove vanno nelle acque profonde donde risalendo alla superficie spesso muoiono lasciando traccia del loro passaggio. (Vedi: Garbini, Fauna, pag. 365^a, sub Leucisco; Malfer, Benaco, pag. 282 e seguenti).

¹ Già al tempo del Marsili si riteneva che il Carpione fosse una forma propria del Benaco. Quantunque Linneo ne avesse fatto dopo una specie indipendente *Salmo Carpio* come pur attualmente ritengono i pescatori, cui sarebbe impossibile dar a credere che due pesci che hanno abitudini ed anche aspetto così diversi come questo e la Trota avessero ad avere un cespote comune. Si propende oggi col Marsili a credere che si trattò di un endemismo caratteristico per adattamento della Trota, *Salmo lacustris* Linn. e ristretto al solo bacino del lago di Garda. A differenza della Trota che è migratrice, cacciatrice, anzi predatrice audace di tutti i pesci che appena presentino dimensioni minori fino al più efferato cannibalismo, il Carpione si nutre di piccoli crostacei limnetici e di Spongille. Fatto quest'ultimo che notò anche il Marsili che giammai ebbe a trovare un pesce nel tubo gastro-enterico di quegli esemplari di Carpione che ebbe a sezionare. Ma oltre il fenomeno della diversità del cibo abituale vi è che la Trota raggiunge dimensioni assai superiori (nel Benaco 15-18 Kg.) laddove sono eccezionali i carpioni che superano il chilogramma di peso. La frega della Trota avviene sulle ghiaje di fiumi influenti ed emissari o poco lungi dalle rive ad acqua bassa; quella del Carpione avviene nella parte profonda del lago in posti ben determinati e ben noti fino dal tempo del Marsilli che li segna anche sulla mappa idrografica premessa allo studio.

Non è certo agevole controllare se veramente ci sia il Carpione nel lago d'Ochrida in Albania che a tutt'oggi è assai poco noto per quanto riguarda la pesca. Ma quelli che il nostro Autore diceva di aver trovato