

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	GRANDEZZA ORDINARIA	LUOGHI CHE PREDILIGE E IN CUI SI CONSERVA	QUANDO GETTA LE UOVA E PROLIFICA
<i>Branzin.</i>	<i>Labrax lupus.</i> Cuv. <i>Percalabrax.</i> L. Chier., fig. 156.	1 a 3 piedi.	Canali profondi e valli.	Nella primavera, in mare ed in valle; nelle valli però non si schiudono le uova.
<i>Caecchia,</i> o <i>Cagnea.</i>	<i>Squalus plumbeus.</i> Nar. <i>Sq. caecchia,</i> Ch., fig. 40, 41.	7 piedi ed oltre	Canali profondi.	
<i>Cantarella.</i>	<i>Cantharus vulgari-</i> Cuv. <i>ris.</i> <i>Sparus cantarel-</i> <i>la,</i> Ch., fig. 132.	4 a 6 poll.	Canali prossimi ai porti.	
<i>Caustelo.</i>	<i>Mugil capito.</i> Cuv. <i>Mugil caustel-</i> <i>lus,</i> Chier., fig. 182.	6 poll. ad un piedecrescente	Bassi fondi della laguna e valli, dove si getta minuto e si serba fino ai tre anni.	Nel mese di gennajo in mare.
<i>Cavalmarin,</i> o <i>Cavalo</i> <i>storno.</i>	<i>Hippocampus gut-</i> Cuv. <i>tulatus.</i> <i>Syngnathus hip-</i> <i>pocampus,</i> Ch., fig. 66.	2 a 3 poll.	Bassi fondi algosi.	Al cominciare di estate.
<i>Cievol</i> e <i>Cievolame.</i> <i>Ciriolo.</i> V. <i>Bisato.</i>	Nome generico con cui chiamansi tutte le specie di <i>Mugine.</i>			
<i>Corbeto e</i> <i>Corbo.</i>	<i>Umbrina cirrosa.</i> Cuv. <i>Sciaena cirrosa.</i> L. Ch., fig. 154.	1 a 3 piedi.	Canali corrispondenti ai porti e valli da gri-giuole.	In gennajo ed in primavera.
<i>Donzele.</i> <i>Dotregan.</i> V. <i>Lotregan.</i>	Nome di varie specie di <i>Labrus.</i>			
<i>Galo o Gà-</i> <i>leto.</i>	<i>Ichthyocoris ga-</i> Bp. <i>lerita.</i>	3 a 4 poll.	Tra le fessure delle pietre del litorale e delle isole.	Primavera.
<i>Ganzariolo.</i> V. <i>Scombro.</i>	<i>Blen. gallus,</i> Ch., fig. 93.			
<i>Gardellini.</i>	Nome di varie specie di <i>Crenilabrus.</i>			
<i>Gatarosola,</i> o <i>Gatizza.</i>	<i>Blennius gattoru-</i> Lin. <i>gine.</i> <i>Blen. vagans,</i> Ch., fig. 96.	3 a 5 poll.	Tra le fessure delle pietre litorale e dei sassi delle isole.	Primavera.
<i>Go, o Goato.</i>	<i>Gobius capito?</i> Cuv. <i>Gobius gous,</i> Ch., fig. 107.	3 ad 8 poll.	Bassi fondi argillosi della laguna ove vive sprofondato in particolar nido da esso costruito, e che custodisce gelosamente nel tempo della proliferazione.	In primavera ed estate entro al proprio nido, in laguna, ove svilup-pasi. Dicesi che tiene la uova in corpo tre mesi, e che i piccioli nuotano solo dopo 14 giorni.
<i>Latesiol.</i> V. <i>Passarin.</i>				