

RAMPEGHIN. *Certhia familiaris*, Linn.

Arrivano questi uccelli in primavera, e si fermano nei nostri boschetti a nidificare. In autunno ritornano a passare. Si possono cioè non ostante ritenere per istazionari, vedendosene in tutte le stagioni. I loro voli sono corti, da un albero all'altro; la carne puzza di formiche.

RAMPEGHIN ROSSO. *V. ROVEGAROLO DE MONTE.*

REALETO, FIORIN, CAVALARIN. *Gallinula pusilla*, Bechst.

Sotto questo nome si abbracciano le due specie di *realeti*, *G. pusilla* e *G. Bailonii*. Arrivan questi uccelli in primavera e si fermano a nidificare. Ritornano d'autunno, e allora s'ingrassano a segno che non sono più atti a volare, ed invece riescono eccellenti a mangiarsi. Frequentano i paludi erbosi ed acquosi di fondo tenero.

REATIN. *V. ROZETO.*

RE DEGLI ORTOLANI. *V. ORTOLAN DE TRIESTE.*

REDESTOLA. *V. CAVAZZUA.*

REDESTOLA. *Lanius meridionalis*, Temm.

Vedesi questo uccello qualche volta in primavera, ma di passaggio, non fermandosi che qualche giorno. È assai raro.

REDESTOLA FALCONIERA, REDESTOLON. *Lanius excubitor*, Linn.

Questo uccello si fa vedere in maggior copia in primavera che in autunno. Nidifica fra noi, e depone il nido sugli alberi e nei cespugli. È eccellente a mangiarsi, specialmente in autunno.

REDESTOLA PICOLA. *Lanius minor*, Gmel.

Anche questi uccelli compariscono in aprile e maggio, ma si possono ritenere fra le nostre specie più rare. Qualche copia nidifica nel Friuli.

REDESTOLA ROSSA, CAVAZZUA ROSSA. *Lanius rufus*, Briss.

Questo uccello giunge soltanto in primavera, ed anche in sì piccola quantità, che si può dir raro. Nel Friuli alcune coppie di esso si fermano a nidificare.

REDESTOLON. *V. REDESTOLA FALCONIERA.*

REPIPIN. *V. STELIN.*

REQUAGIO ROSSO. *Gallinula Crex*, Lath.

Questi uccelli fanno il loro primo passaggio in marzo, aprile e maggio, ed alcuni si fermano a nidificare nei trifogli. Il più abbondante passaggio effettuasi in agosto e settembre, e se ne trovano anche in ottobre, nei quali mesi sono sì grassi, che appena possono volare. Corrono velocemente. Dal loro ripetuto *crec crec*, Linneo diede loro il nome specifico. Nell'ottobre 1841, vi fu un passaggio abundantissimo in tutto lo Stato veneto ed anche nella Lombardia. Riescono eccellente cibo, e, secondo noi, uno dei migliori selvatici.

RISAROLO, CANETO. *Sylvia aquatica*, Lath.

Questi uccelletti arrivano nei paduli in aprile, e si fermano a nidificare. Stanno sempre fra i giunchi e le canne, e si ascondono fra le foglie radicali delle piante palustri. Corrono e vanno saltellando da un luogo all'altro facendo piccoli voli. In settembre e ottobre divengono grassissimi, e sono un arrosto squisito per le tavole signorili.

ROCHETO. *V. CRECOLA.*

RONDIN, TARTAGIN. *Hirundo urbica*, Linn.

Vengono questi uccelli alla fine di aprile o ai primi di maggio, si trattengono a