

Anche questi uccelli si veggono in quasi tutte le stagioni, mentre se ne ammazzano da gennajo a settembre. Devono nidificare nelle nostre barene e nelle valli, ma noi non abbiamo mai trovato i loro nidi. In agosto si ammazzano i novelli, che si lasciano facilmente avvicinare. Alla fine di estate se ne veggono nume rose compagnie. Sono però meno abbondanti dei cocali comuni, dei quali hanno il grido più grave e più forte. Non si fa uso della loro carne nelle tavole.

COCAL NEGRO, COCAL BASTARDO. *Lestris parasiticus*, Boiè.

Assai di raro viene ucciso fra noi quest'uccello; pure qualche individuo vi comparisce sul terminar della state.

COCAL NEGRO A COA LONGA, COCAL FORESTO. *Lestris Pomarinus*, Temm.

Uccello assai raro fra noi. Ne venne ucciso uno li 8 settembre 1845 in laguna, che stava mangiando sopra un mucchio d' alga galleggianti.

COCAL NEGRO FORESTO. *V. PROCELARIA.*

COCAL PICCOLO. *Larus minutus*, Pallas.

Per quanto ci consta non si sono veduti questi uccelli fra noi che in agosto, settembre, novembre e gennajo. Sono rari molto, e si frammischiano or coi *cocali* ed or con le *cocalete*.

COCALETA NERA, CEOLINA. *Sterna nigra*, Linn.

Compariscono questi uccelli agli ultimi di aprile o ai primi di maggio, e si fermano tutta la estate fino all'ottobre. In giugno sono numerosissimi. Nidificano nelle vicine valli. Si cibano volando. Volano in truppe numerose allargate e disperse. Si uniscono a migliaja sopra alcune barene per dormire. Il loro volo è rilasciato e a lanci, talor però veloce e disteso senza batter d'ali. Si alzano e abbassano in un momento, e con i loro scambietti deludono il cacciatore. Sono poco buoni a mangiarsi avendo la pelle dura.

COCALETA NERA BASTARDA. *Sterna leucoptera*, Temm.

Uccelli che arrivano in maggio, e veggonsi fino ad agosto. Sono piuttosto rari; pure si dee supporre che nidifichino poco lungi da noi. Hanno il volo ed il grido simili alla specie nera. Passano alle volte in truppe numerose di dugento e più. Se ne ammazzano di giovani. Apertone uno, avea il ventricolo pieno della mosca detta *Stratiomys idroleon*, Linn.

COCALETA PICOLA, COCALETA BIANCA, SCAGOSSA PICOLA, GIAGÀ PICCOLO. *Sterna minuta*, Linn.

Comparisce in maggio, nidifica, e parte in settembre. Queste *cocalete* vanno alle volte in truppe numerose; sono però meno abbondanti dei così detti *giagà* e delle *cocalete negre*. Allorchè volano, fanno udire un vario gracidiare, specialmente dopo di essere state intorite. Sono poco buone a mangiarsi.

COCALON, MARTINASSO. *Larus marinus*, Linn.

Questo uccello non si vede che rarissime volte in estate, e dopo qualche burrasca di mare, o dopo un vento impetuoso. Vive al nord dell'Europa, ed è da riporsi fra i nostri uccelli rari.

COLOMBASSO, COLOMBO SALSARO. *Columba Palumbus*, Linn.

Questi uccelli si fanno vedere fra noi due volte all'anno, cioè in aprile e maggio, e poi in settembre, ottobre e novembre. Sono buoni a mangiarsi, ma riescono sempre duri.

COLOMBO SALVADEGO, COLOMBO TORESAN. *Columba Oenas*, Linn.

Uccelli che passano due volte all'anno, da marzo a maggio, e da settembre a