

Dalle nostre ricerche e da quelle dell' Olivi, del Martens e del Meneghini, il qual ultimo sta molto utilmente occupandosi nello studio di tali esseri, risulta che tra i TUBULIPORIDI non sono rare sopra i Sargassi e le Cistoceire crescenti in laguna, la moltiforme *Tubulipora verrucosa*, e la delicatissima *Crisia eburnea*; che tra i CELLARIDI trovansi comuni e di bello sviluppo, aderenti ai pali dell' estuario ed alle grigiule che servono di riparo e scomparto alle nostre valli, la *Bicellaria fastigiata* e la *B. scruposa*, oltre le *B. reptans* e *ciliata*, che appariscono un poco più di rado. È pur frequente nei medesimi luoghi e vegeta assai l' *Acamarchis neritina* e la prossima ad essa *Cellaria avicularia*, Lk.; ma lo è meno l' *Amathia lendigera*, Lamx, a cui vicina abbiamo forse altra specie. Aggiungasi a questa l' *Aethea anguina* spesso serpeggiante sulla zostera, sopra fuchi od altro.

Raramente e poco sviluppate rinvengonsi talvolta sui corpi accennati due SALICORNARIDI, cioè la *Salicornaria gracilis*, n., e la *Cereola ceroides*, nob. (*Cellaria ceroides*, Lk.).

Tra FERUSIDI incontrasi talvolta di color rosso come cresta di gallo, evanescente col disseccamento, aggruppata sullo stipite dei Sargassi, una specie di *Pherusa*, già indicata dal Ginnani, tav. 55, f. 113, alla quale imponemmo il nome di *Ph. adriatica*, sembrandoci differire dall' unica specie conosciuta, avente colore di ambra.

La famiglia degli ESCARIDI ha due rappresentanti, la *Cellepora spongites*, che incrosta spoglie testacee, ma non arriva mai a grande sviluppo, e la *C. hyalina*, che cresce frequentemente sulle foglie di zostera. Pescasi talvolta in alcune situazioni profonde prossime ai porti qualche piccolo esemplare dell' *Eschara fascialis* e della *gracilis*, come pure della *Retepora cellulosa*, detta volgarmente *rosa de mar*; ma di queste, come di altre specie di Briozoi più frequenti nel mare, devesi considerare soltanto eventuale la comparsa in laguna. Lo stesso ci sembra poter dire di una specie da noi trovata, 20 anni sono, in grande ammasso vicino alle saline di Chioggia, allora creduta un' alga (*Valonia intricata*, Agardh), ma presentemente conosciuta come animale prodotto. Sembra approssimarsi