

Renier (Prodromo, 1804, e tavole incise inedite), che ha per veste la *Sabella membranacea* del medesimo autore. Traesi, benchè di rado, dai canali profondi un piccolo annelide prossimo al *Lumbrinereis* del Bleinville, e forse il *Lumbr. Nardonis* Grube, a nuovo genere appartenente, da noi detto *Nerinella*. A questo corrisponde la *Nereis chermesina* (Ren., tav. inc. inedite) o *Amphinome chermesina*, Ren. (Prodromo, 1804), e perciò intitoleremo la specie *Nerinella chermesina*, fino a che si dimostri esser essa uno stato transitorio di qualche altro annelide, come ora pensasi da taluno relativamente ad altri esseri di questa classe. Anche la *Tuba divisa*, Ren., riviensi, benchè raramente, nelle medesime situazioni. Essa ha un involucro gelatinoso assai consistente, non conservabile colla disseccazione, detto dal Renier, nel suo Prodromo, *Sabella gelatinosa*.

ENTOMOZOI APODI E SOTTO ANNELIDI DI BLEINVILLE.

Di queste due classi conosce il volgo pochissime specie, le quali pure collettivamente distingue col nome di *vermi*.

Aleune (Entozooti, Rudolfi) vivono parassite entro ai visceri degli animali della laguna, e spettano ai generi *Filaria*, *Ascaride*, *Distoma*, *Scoliee*, *Echinorinco*, *Cucculano*, *Ligula*, *Botriocefalo* ed altri.

Quasi ciascun pesce ne ha, in certe circostanze, più d' una e taluna di particolare. Sarebbe allontanarsi di proposito entrando in particolarità su di esse che poco interessano la Fauna volgare.

Nei crostacei e molluschi sono più rare o men consociute. Quelle delle classi inferiori difficilmente si sottomettono a scientifica indagine. Fatto curioso e poco avvertito è potersi trovare distomi viventi parassiti anche nell' esterno di qualche animale; e noi vi ebbimo bell' esempio nel *Pagurus Chiereghini*, Nob., vivente più in mare che in laguna, un individuo del quale teneva aderente alla coda, nel solito modo garantita, alcuni grossi distomi che conserviamo, da noi detti, perchè non riferibili a nota specie, *Distoma paguri*.

Caso analogo osservasi non di rado nel *Pecten Jacobeus*, Lk., volg. *capasanta*, ed in qualche individuo dell'ostrica comune, ed in