

Oltre le specie accennate portanti nome vernacolo, che sotto la denominazione generale di *pesce armà* costituiscono la crostaceologia volgare delle nostre lagune, poche ve ne hanno di piccolissima mole, le quali destano interesse al naturalista soltanto. Di queste, alcune ancor nuove, faremo parola nella nostra adriatica Fauna. Ora ci basta far conoscere trovarsi frequente fra le alghe e su varie specie di spugne viventi nell'estuario lo *Stenorynchus phalangium*, Lk., chiamato da' pescatori *ragno* o *zanzalaro de laguna*; eservi due specie rarissime di *Alpheus* descritte dal Chiereghin col nome di *Cancer gambarellus*, sp. 56, fig. 50, e *gambarelloides*, sp. 57, fig. 51, ed alcune, che vogliono essere meglio studiate, spettanti a generi diversi dell' ordine degli AMFIPODI, famiglia de' GAMMARIDI, fra' quali il *Cancer algensis*, Chiereghin, sp. 60, fig. 76-79, che ha la particolarità di tessersi una veste a forma di cornucopia sulle foglie di zosteria entro cui sta nascosto come le larve delle Friganee. Venne questo creduto dal Leach un *Podocerus*, ma devesi considerare come un nuovo genere, che intitolammo *Lusyta*, prossimo all'*Atylus*, Leach, ed al *Carapus*, Say.

Vivono inoltre fra le nostre alghe ed attaccate agli spongiali due specie di LAMEDIPODI appartenenti al genere *Caprella*, la minor delle quali trovasi abbondantissima. Furono figurate dal Chiereghin, l'una col nome di *Cancer linearis*, sp. 61, fig. 80, e l' altra col nome di *Cancer linearis*, var., fig. 81, 82.

Fra gli Isopodi abbiamo il *Bapiro*, parassito del *Crangon vulgaris*, alcune specie di *Sphaeroma* e d' *Idotea*, ed altre appartenenti a generi affini e forse nuovi. Fra gli ENTOMOSTRACEI BRANCHIOPODI trovasi pure in laguna, ne' fossati salmastri, ed in alcuni de' nostri pozzi, qualche specie importante. Finalmente, sopra gli Spongiali e ZOOFITI, abitatori della laguna, riscontransi più o meno frequenti varie specie interessantissime di *Picnognidi*, volgarmente dette *ragneti de paluo* o *de canal*. Tre di queste sono descritte e figurate dal Chiereghin. La prima, che chiama *Cancer spurius*, sp. 62, fig. 83, 87, ha dieci piedi eguali spinosi e la coda triloba, ed appartiene ad un nuovo genere prossimo al *Phosiochilus*, Latr., che intitolammo