

CLASSE DE'

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	GRANDEZZA	LUOGO OVE ABITA	MESI NEI QUALI PIU' ABBONDA, E QUANTITÀ
<i>Buli col granzo.</i>	<i>V. Granzeti</i> col bovolo.			
<i>Cimese.</i>	<i>Porcellana longicornis</i> ? <i>Fabr.</i>	3 a 4 lin.	Sopra gli spongiali.	Frequente tutto l'anno.
<i>Corbola.</i>	<i>Gebia venetiarum.</i> <i>Nardo.</i> <i>Cancer scyllarus.</i> Chiereg., sp. 57, fig. 72.	2 a 3 poll.	Bassi fondi argilloso-fangosi; sprofondato 2 a 3 piedi.	Frequente tutto l'anno. specialmente dopo forti burrasche.
<i>Corbola falsa o salvadega.</i>	<i>Callianassa subterranea.</i> <i>Leach</i> <i>Cancer lunulatus.</i> Chiereg., sp. 33, fig. 47.	2 poll. circa.	Come la specie precedente.	In estate; piuttosto raro.
<i>Gambaro.</i>	<i>Palemon squilla.</i> <i>Fabr</i> <i>Cancer squilla.</i> Chiereg., sp. 39, fig. 53.	1 1/2 pol. circa	Bassi fondi argillosi coperti di zostera.	Autunno, in inverno e primavera; abbondante.
<i>Granziporeto de palo.</i>	<i>Pilumnus aestuarii.</i> <i>Nardo.</i>	1 a 2 poll.	Sulle palafitte sparse nella laguna, specialmente vicino ai canali.	Tutto l'anno; non molto frequente.
<i>Granziporon.</i>	<i>Platycarcinus pagurus.</i> <i>M. Edw.</i> <i>Cancer fimbriatus.</i> Ol. Chier., sp. 14, fig. 27.	5 poll. ad un piede.	Maggiori profondità della laguna, ed all'imboccatura de' porti.	Molto raro in ogni stagione.
<i>Granziporo.</i>	<i>Eryphia spinifrons,</i> masc. <i>Sawigny.</i> <i>Cancer pagurus.</i> Chiereg., sp. 17, fig. 30.	2 a 6 poll.	Profondità maggiori della laguna, ed imboccature dei porti, specialmente fra i sassi del litorale.	Frequente in autunno più che in altra stagione.
<i>Granzeti col bovolo.</i>	<i>Pagurus varians.</i> <i>Costa</i>	1 poll.	Bassi fondi e canali.	Tutto l'anno abbondante.
<i>Granzeti de le ostrighe.</i>	<i>Pinnotheres pisum.</i> <i>Latr.</i> <i>Cancer pisum.</i> Chiereg., sp. 1, fig. 1.	2 a 3 lin.	Per ordinario dentro alle ostriche viventi.	In tutti i mesi, ma raramente.
<i>Granzo.</i>	<i>Carcinus maenas,</i> <i>Leac.</i> var. <i>aestuarii,</i> nob. an sp. dist. <i>Cancer maenas-var.</i> Chier., sp. 11, fig. 11-28.	2 poll. circa.	Ciascun fondo della nostra laguna.	Abbondantissimo in primavera, in estate ed in autunno. Traslocasi in mare all'avvicinarsi del verno, all'imboccatura dei porti e lungo le coste