

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	GRANDEZZA ORDINARIA	LUOGHI CHE PREDILIGE E IN CUI SI CONSERVA	QUANDO GETTA LE UOVA E PROLIFICA
<i>Scombro.</i>	<i>Scomber colias.</i> <i>Cuv.</i> <i>Scomber scomber,</i> Chier., fig. 159.	4 poll. a 10.	Porti e canali corrispondenti.	.....
<i>Sfogio zentil, o nostran, o de vale.</i>	<i>Solea vulgaris.</i> <i>Cuv.</i> <i>Pleur. zentilis,</i> Chier., sp. 116.	6 poll. ad 1 piede.	Luoghi fangosi della laguna e valli.	.....
<i>Soazo.</i>	<i>Psetta rhombus.</i> <i>Bp.</i> <i>Pleuronectes lunatus,</i> Chiereg., fig. 123.	8 poll. ad 1 piede e mezzo.	Luoghi fangoso-argilosì.	In estate.
<i>Sparo e Sparolo.</i>	<i>Pagrus vulgaris.</i> <i>Cuv.</i> <i>Sparus sparulus,</i> Chier., fig. 134.	4 a 6 poll.	Porti e profondità maggiori della laguna.	Estate.
<i>Spinarolo.</i>	<i>Gasterosteus aculeatus?</i> Chier., fig. 158.	<i>L.</i> 1 poll. ad 1 1/2	Valli prossime alla terraferma, e fossati salmistrari e scoli delle ortaglie.	Estate.
<i>Suro.</i>	<i>Caranx trachurus.</i> <i>Cuv.</i>	5 a 9 poll.	Canali profondi della laguna accidentalmente.	.....
<i>Teston.</i>	<i>Scomber surus,</i> Chier., fig. 164.			
<i>V. Avocato.</i>				
<i>Tria.</i>	<i>Mullus sarmuletus.</i> Chier., fig. 166.	<i>L.</i> 4 a 9 poll.	Porti e canali profondi.	.....
<i>Variolo.</i>				
<i>V. Branzin.</i>				
<i>Volpina.</i>	<i>Mugil cephalus.</i> <i>Cuv.</i> <i>Mugil vulpinus,</i> Chier., fig. 139.	1 a 2 piedi.	Canali e valli.	In febbrajo in mare. In aprile si trasporta coi suoi piccoli in laguna.
<i>Verzelata.</i>	<i>Mugil saliens.</i> <i>Risso.</i> <i>Mugil verzelata,</i> Chier., fig. 181.	da 8 poll. ad 1 piede e 4 poll.	Canali e valli.	Credono i pescatori che getti le uova tre volte all'anno, e che i piccoli entrino in laguna in marzo, maggio e luglio. Dice il valligiano che in agosto la <i>vova ponze a la verzelata</i> , e che vorrebbe lasciar la valle per andar in mare a deporla.