

col margine, sutura e scudetto di un verde ramineo. Addome di sopra rosso con quattro punti bruni, e coll'apice fosco ramineo. Ali rosse, con la base, e le nervature jaline. Lungo 8 linee; largo 5. Trovasi sulle barene salse sopra il santonico in agosto.

(6) *Coccinella villosa*, Contarini. Nera, coperta di una peluria biancastra. Il capo dinanzi, le antenne, i piedi ed i palpi sono di un pallido ferrugineo o picco. Torace trasversalmente dilatato, nero, e terminato in punta smussata. Scudetto triangolare, piccolo e nero. Elitre nere, con due macchie per ciascuna di color luteo-ferrugineo, e coll'orlo dell'apice di questo colore. Di sotto del corpo, nero, lucido, minutamente punteggiato. Ali brune. Lung. lin. 1; larg. 1/2. Trovasi a Venezia negli orti in luglio.

(7) *Acrydium maculatum*, Enc. *Gryllus insubricus*, Scop. Differisce dal grillo oscuro, mentre in questo vi ha una macchia nera sulle ali, e nell'oscuro invece un'intera fascia. Trovasi al Lido, in luglio.

(8) *Lygaeus spinulatus*, Contarini. Bruno, col torace anteriormente al di sotto armato di due acute spine, col capo avente ai lati delle spine ramificate. Le elitre fuliginose sparse di punti trasparenti bianco-pallidi; le ali nere. Addome di sopra rossastro-pallido con l'orlo nero e bianco a macchie; di sotto rosso bruno-bigio punteggiato di bianco nel contorno, con l'apice bifido. Gambe semplici, lunghe e sottili, rossastre e macchiate di punti bruni; le ginocchia, la base delle tibie, e tutti i tarsi sono neri. Lung. 1 centimetro e 1/2; larg. 3 millimetri. Trovasi al Moranzan nei campi in settembre. *Raro*.

(9) *Acanthia minima*, Contarini. Tutta nera, con le antenne, i piedi, e le semi-elitre gialliccio-pallide alla base, e brune all'apice. Lung. 1 lin.; larg. appena mezza. Corre assai presto. Trovasi a Venezia negli orti in luglio.

(10) *Acanthia irrequieta*, Contarini. Nera, con i lati del torace, i piedi, le antenne e le elitre pallide. Lung. 1 1/2; larg. 1. Trovasi sulle barene inondate in luglio. La sua larva è tutta di un color bianchiccio cinereo un po' traente al verdastro, ed ha soltanto gli occhi neri.

(11) *Aphis Limonii*, Contarini. È di un color rosso carico di sangue o pavonazzo, con la tromba o succhiatojo, le gambe, il cornetto in mezzo all'ano, la metà delle antenne verso la base, e le ali di un bianco trasparente. Le ginocchia, le estremità delle tibie, i tarsi, la base e la metà dell'antenne verso l'apice, i due cornetti all'estremità del corpo posti ai lati, neri. Alcuni individui sono privi di ali, e quelli che le hanno, le portano rovescie. Lungo 1 linea, e negli individui alati due.

Vive sopra le foglie dello *Statice Limonium*, e per lo più sopra il peziolo. Le antenne gli servono senza dubbio di un senso di tatto, mentre non avanza di un passo se prima non tasteggia i corpi che gli si parano dinanzi con le sue antenne delicatissime e sottili in punta, e perciò sensibilissime. Se vien tocco un po' bruscamente, si finge morto, e si lascia cadere a terra. Schiacciato, dà una tinta color di sangue, cosicchè pare contenga internamente sangue. Anche i suoi zuccherosi escrementi sono di un color rossiccio e molto vischiosi.

(12) *Nematus Redii*, Contarini. Nel luglio dell'anno decorso, venne letta dal Contarini una diffusa memoria sopra i costumi e la metamorfosi di questo insetto all'I. R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia.

(13) *Cleonymus compressus*, Contarini. *Psilus*. Jur. Capo e torace punteggiati di bruno. Addome nero, lucente, compresso ai lati, un poco peziolato e canalicolato al di sotto nell'apice, ove resta ascoso il pungolo. Ali bianche. Piedi e antenne ferruginei. Lung. 1 lin. e 1/2. Trovasi al Lido, sull'erbe.

(14) *Bombus luctuosus*, Contarini. Irsuto, giallo, coll'addome giallo alla base, sulla quale vi è una fascia nera interrotta. Il capo ed i piedi neri.

È vicino all'*italicus*, ma differisce per la fascia nera dell'addome, e per la base gialla di esso. Trovasi al Lido.

(15) *Arctia maculata*, Contarini. È tutta bianca di neve, con le antenne brevemente pettinate, bianche di sopra, nere di sotto, con le tibie e tarsi di un giallo ruggine. Il corpo, le ali tutte, sopra e sotto, sono di un bianco puro. Si osserva sopra i quattro primi anelli