

*nemoralis*, detto *boccolo d'orto*; e gli *H. pomatia*, *grisea* e *lucorum*, chiamati *bocoloni*, *buovoli grandi*, recansi a noi dalla terraferma, non trovandosene nei nostri orti di grandezza e quantità sufficiente per servire a' bisogni della quaresima.

Specie più o men frequenti sono gli *H. cinctella*, Drap., *striata* ed *ericetorum*, Müll., *conica*, Drap., ed altre minori, avvertite appena dal volgo col nome collettivo di *bocoleti de i orti*, *de i muri*, *de i piteri*, *de l'usa*, *de la marina*, ecc. Con tali nomi vernacoli chiamasi pure qualche *Bulimus* comune nel litorale, come sarebbe il *B. acutus*, Br.; qualche *Pupa* e qualche *Clausilia* delle marenne, de' muri e delle ortaglie, quali sarebbero la *P. cinerea* e *polyodon*, le *Clausilia bidens* e *papillaris*, Drap., ed altre. Abbiamo inoltre qualche *Achatina*, tra cui l'*A. acicula* e *lubrica*, e la *Succinea amphibia* vivente nei bassi terreni paludosi presso alle acque di scolo. Tra i CICLOSTOMARI, trovasi non molto frequente ne' nostri orti il *Cyclostoma elegans*, ma nelle marenne e nei bassi fondi delle valli, vive abbondantissimo tra le alghe, insieme a qualche *Rissoa*, il *Choristoma truncatum*, che perde l'acuta sua punta facendosi adulto; e così pure alcune AURICOLEINE, delle quali l'*Auricola myosotis* è la più comune. I LIMNEANI VIVONO ne' fossati ove s'accumula l'acqua piovana in siti dell'estuario confinanti colla terraferma, e sono il *Limneus auricularius*, il *palustris*, qualche varietà dello *stagnalis*, ecc.

Ne' luoghi stessi incontransi i *Planorbis corneus*, *carinatus* e *vortex*, detti in unione agli altri *bocoli dei fossi*; come pure v'hanno tra PERISTOMI qualche *Valvata* e varie *Paludine*, delle quali sono abbondanti molto la *P. termalis* e la *P. acuta*, negli scolaticii ove l'acqua è salmastra. Le NERITACEE, le JANTINEE, le ALIOTIDEE e le PLICACEE, che più amano il vivo mare, non hanno rappresentanti in laguna, bensì ne offrono le SCALARINE una specie, *Scalaria communis*, Lk., abbastanza frequente, che vive ne' fondi fangoso-renosi fra le alghe, e stimavasi dal Planco una delle porporifere degli antichi.

È più ricca e profittevole la famiglia de' TURBINACEI; appartiene a questa una specie, il *Trochus albidus*, Gm., e sue varietà, detta volg. *caragolo tondo*, assai vantaggiosa al povero pescatore, che nei