

C L A S S E

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	GRANDEZZA ORDINARIA	LUOGHI CHE PREDILIGE E IN CUI SI CONSERVA	QUANDO GETTA LE UOVA E PROLIFICA
<i>Angusigola falsa o sal- vadega.</i>	Syngnathus Ron- deletii? <i>De la Ro- Syn. Angusigola, che.</i> Chier., fig. 64.	4 poll. a 1/2 piede.	Regioni algose e coperte di zosterà.	Primavera in laguna, ove anche si sviluppa.
<i>Angusigola, o Bisigola.</i>	Belone vulgaris. <i>Cuv.</i> <i>Exos belone, L.</i> Chier., fig. 176.	1 piede ad 1 1/2	Canali profondi e valli da grigiule.	.....
<i>Anguela. Anguila. V. Bisato.</i>	Atherina Machon. <i>Cuv.</i> <i>Atherina hepse- tus, L. Chier.,</i> fig. 177.	2 a 3 poll.	Canali, bassi fondi e valli.	Nella primavera in lagu- na, ove anche si svilup- pa.
<i>Avocato, o Teston. Baicoli. V. Branzin.</i>	Var. dell' <i>Ang. marina, Ch.</i> ; ha testa grossa ai lati e colore più carico.	2 a 3 piedi.	Fondi fangosi; sprofon- dato.	.....
<i>Barboni. Batauro. V. Caustelo.</i>	Mullus barbatus. <i>Lin.</i> Chier., fig. 165.	4 a 7 poll.	Regioni spoglie di pian- te marine.	Al finire del verno nelle regioni algose del mare.
<i>Bisato feme- nale.</i>	Anguilla vulgaris. <i>Cuv.</i> <i>Muraena anguil- la, Ch.,</i> fig. 67.	2 a 4 piedi.	Fondi fangosi; sprofon- dato da 1 a 3 piedi.	Dicesi prolificare in e- state.
<i>Bisato ma- rin e Te- ston od A- vocato.</i>	Anguilla marina. .... Chier., fig. 68.	2 a 3 piedi.	Come il precedente, ma meno approfondato. Nei vivai dura meno del <i>femenale</i> e dimagra, sof- fre pure in minor gra- do il troppo freddo o calore, e perisce più presto all' asciutto.	È detto popolare, che in giugno, luglio ed ago- sto il <i>bisato marin</i> si <i>punta</i> o diventa <i>feme- nale</i> .
<i>Bosega. Botolo. V. Caustelo.</i>	Mugil Chelo. <i>Cuv.</i> <i>Mugil Buosega,</i> Chier., fig. 180.	1 a 2 piedi.	Fondi fangoso-algosi e valli arginate in cui con- servasi.	In febbrajo, in mare.