

TORDINA PICOLA. *Anthus Doricus*, Bechst.

Anche questi uccelli non passano che in settembre e ottobre, ma sono rarissimi. Rassomigliano un poco alle *tordine*, ma sono più piccoli. Hanno la grandezza di una *fista*, ma nella impiumatura rassomigliano al *tordinon*.

TORDINA PICOLA FORESTA, FISTA FORESTA. *Anthus rufogularis*, Brehm.

Del pari che i suddetti, si mostrano questi uccelli solamente in settembre e ottobre. Hanno le stesse abitudini, ed il canto quasi simile a quello dell' *Anthus Richardi*, al quale rassomigliano molto, ma sono quasi la metà più piccoli, ed hanno l' unghia del pollice e tutte le altre molto più corte di quello. Uccelli assai rari.

TORDINON. *V. TORDINA GROSSA.*

TORDO COLOMBIN. *V. MERLO CIAC, GAZZANELA.*

TORDO DA UA. *Turdus musicus*, Linn.

Passano questi uccelli due volte all'anno, e sempre in grande abbondanza. Nel marzo e aprile si fermano meno, ma nell'ottobre e novembre molto più. Qualche coppia fermasi a nidificare. Il loro canto di primavera è un poco simile a quello del merlo, ma meno forte e più posato ed armonioso. Sono semi-stazionari, mentre ci lascian per pochi mesi. In autunno sono grassissimi ed eccellenti a mangiarsi.

TORDO GAZZARO. *V. MERLO GAZZARO, MERLO GAJON.*

TORDO MARIN. *V. VESPAROLO.*

TORDO SISARIN, TORDO SPINARIOL. *V. SISARIN.*

TORTORA, TORTORELA. *Columba Turtur*, Linn.

Questi uccelli compariscono in buon numero in primavera, e si fermano a nidificare. Si trattengono al più fino a settembre, poi partono. Se ne ammazzano di grassissimi, e sono eccellenti e saporiti.

TOTANELO. *Totanus stagnatilis*, Bechst.

Si mostra quest'uccello tra noi in maggio ed in ottobre. Viene in più o meno numerose compagnie. Ama e frequenta i luoghi inondati, i prati umidi ed irrigati. Ha un forte sibilo, e spesso ripetuto. Il suo volo è rapido. Si mangia, ma ha un po' di gusto di pesce.

TOTANELO MACHIA'. *Totanus macularia*, Temm.

Si fa vedere quest'uccello due volte all'anno in marzo e aprile, ed in ottobre e novembre. Ama le praterie umide e i luoghi sabbiosi coperti da poca acqua, ed anco le risaie seminate di fresco. È buono a mangiarsi.

TOTANO. *Totanus fuscus*, Leisler.

Questi uccelli arrivano di marzo e di settembre. Nidificano in aprile e maggio assieme al *T. calidris*. Nel tempo degli amori si coprono tutti di piuma nera. Si mangia come il *T. calidris*, ma non è stimato, abbenchè sia di esso meno comune.

TOTANO. *Totanus calidris*, Bechst.

Abbiamo questi uccelli per istazionari, mentre se ne trovano in ogni stagione. Nidificano sulle nostre barene e valli. I piccoli, appena usciti dall'uovo, vanno correndo qua e là. I vecchi, al tempo dei nidi, vengono a svolazzare sopra il capo del cacciatore che gli ammazza facilmente. Si mangiano questi uccelli, ma vengono considerati di qualità inferiore.

TOTANO BASTARDO. *Tringa cinerea*, Linn.

Si vede quest'uccello in primavera, e qualche rara volta in ottobre e novembre. Per lo più trovasi solo, o in compagnia di tre o quattro. È poco diffidente, e buono a mangiarsi.