

tutta la state. Riescono eccellenti a mangiarsi, particolarmente quando sono grassi, il che succede in settembre.

BRUSOLA. *V.* COMPARE PIERO.

BRUSTOLON. *V.* PETASSO.

C

CAENASSO. *V.* GALINAZZA DE MAR. *Haematopus ostralegus*.

Compariscono questi uccelli in aprile e maggio, nidificano, ed in agosto partono. Fanno il nido sugli scanni sabbiosi, fra i giunchi, e i piccoli appena nati corrono assai presto e si nascondono fra l'erbe. Frequentano il litorale e le rive dei nostri canali. Si pascono di conchiglie e granchi, e prima di alzarsi a volo, prendono moto correndo e spiegando le ali, come fa la pavoncina. Si veggono alle volte solitari, ed ora in compagnie di dieci a dodici. Sono uccelli accorti, ed è difficile l'avvicinarsi ad essi. La loro carne a nulla vale, perchè puzza di pesce.

CALANDRA. *V.* CALANDRON.

CALANDRIN. *V.* BERLUATO.

CALANDRIN. *V.* LODOLIN.

CALANDRON, CALANDRA. *Alauda Calandra*, Linn.

Fra noi è assai raro questo uccello, e si vede qualche volta in ottobre e novembre frammischiato con le allodole di passaggio. Trovasi però in qualche abbondanza nella Dalmazia e nei contorni di Trieste, ove nidifica.

CALEGHER. *V.* SCARPOLARO.

CAMPANATO la femmina. *V.* QUATROCHI il maschio.

CANARIN DE LA CHINA. *V.* SONETO.

CANARIOLA. *V.* CANELON.

CANELIN. *V.* FORACANELE.

CANELON, CANARIOLA, CELEGA PALUGANA. *Sylvia turdoides*, Meyer.

Uccelli di doppio passaggio, comparendo in gran copia in aprile e maggio per nidificar fra i canneti, e lungo le rive erbose dei fiumi, e poi partire. Ritornano in settembre e ottobre, ed allora s'ingrassano a dismisura e sono eccellenti. Si ascondono con somma facilità e prestezza nel più folto dei canneti.

CANETO. *V.* RISAROLO.

CANEVAROLA. *V.* BIANCHETA.

CAONERO il maschio, **CAOROSSO** la femmina. *Sylvia atricapilla*, Lath.

Passano in primavera da marzo a maggio, nidificano in giugno, e partono per ritornar poi in settembre e ottobre. Il maschio canta assai bene, ed il suo canto è dolce ed armonioso; le note son brevi, ma il gorgheggio delicato. La sua carne è di ottimo gusto, ma non ingrassa mai quanto il *becafigo*.

CAONERO diverso. *Sylvia melanocephala*, Lath.

Questo è un uccello rarissimo fra noi, e si fa vedere soltanto in primavera. Non ci è noto che sia stato ancor preso in autunno. Egli è molto diverso dal capinero comune e per le forme e pei costumi.

CAONERO FORESTO. *Sylvia melanopogon*, Temm.

Il suo passaggio è veramente accidentale, e non fu trovato che una volta sola, per quanto ci è noto, in primavera.

CAOROSSO femmina. *V.* CAONERO il maschio.

CAOROSSO. *V.* MAGASSETTO ROSSO.