

cora inferiore al massimo di 209 registrato dai PP. Gesuiti. Anche la nebulosità è stata superiore alla media, minore il numero dei giorni sereni e maggiore il numero dei giorni nuvolosi.

Per quanto riguarda la temperatura la primavera è stata fredda, l'estate caldissima con un massimo di 36° il 5 agosto, l'autunno normale e dicembre mite.

* * *

Ed eccoci arrivati all'anno 1932, nel mese di settembre del quale s'interrompono le mie osservazioni in seguito al mio trasferimento ad altra sede.

Tab. VI. — DATI METEREologici MENSILI PER I PRIMI OTTO MESI DELL'ANNO 1932.

Mese	Temperatura (C.)					Stato del cielo				Pioggia (in m)		
	Minima assoluta	Massima assoluta	Media minimi	Media massimi	Media generale	Giorni			Nebulosità	Tutto il mese	Giorni di pioggia	Giorno più piovoso
						Sereni	Misti	Coperti				
Gennaio	-2 ⁵	12 ⁰⁵	0 ⁰⁷	7 ⁰⁸	4 ⁰²⁵	17	10	4	2.9	47.2	4	38.5
Febbraio	-5 ⁵	10 ⁰⁵	-1 ⁰²	4 ⁰⁸	1 ⁰⁸	9	10	10	5.2	64	9	32
Marzo	-1 ⁵	17 ⁰⁵	4 ⁰⁶	11 ⁰²	7 ⁰⁸	4	15	12	6.4	249.4	11	53.4
Aprile	5 ⁰	21 ⁰⁵	9 ⁰¹	17 ⁰¹	13 ⁰¹	2	18	10	6	174	13	71.6
Maggio	7 ⁵	28 ⁰	13 ⁰⁸	23 ⁰	17 ⁰⁹	2	26	3	4.9	86.7	12	29.4
Giugno	12 ⁰	30 ⁰⁵	16 ⁰	26 ⁰⁶	21 ⁰³	8	22	—	4.7	36.2	5	16.5
Luglio	16 ⁰⁵	32 ⁰⁵	20 ⁰	29 ⁰⁷	24 ⁰⁹	9	22	—	3	106.1	7	82.5
Agosto	16 ⁰	34 ⁰⁵	21 ⁰	31 ⁰	26 ⁰	15	16	—	2.3	7.8	3	3.8

Gennaio e febbraio sono stati poco piovosi e freddissimi specie febbraio con ben 7 giornate di neve du-